

安全知识学习资料

一、实验室安全习题

1、烘箱（干燥箱）在加热时，门可以开启。（ ）

（标准答案：错）

2、电源插座、接线板、电线的容量应满足电器功率的需要。（ ）

（标准答案：对）

3、为避免线路负荷过大，而引起火灾，功率 1000 瓦以上的设备不得共用一个接线板。（ ）

（标准答案：对）

4、对于触电事故，应立即切断电源或用有绝缘性能的木棍棒挑开和隔绝电流，如果触电者的衣服干燥，又没有紧缠住身上，可以用一只手抓住他的衣服，拉离带电体；但救护人不得接触触电者的皮肤，也不能抓他的鞋。（ ）

（标准答案：对）

5、实验室内应使用空气开关并配备必要的漏电保护器；电气设备应配备足够的用电功率和电线，不得超负荷用电；电气设备和大型仪器须接地良好，对电线老化等隐患要定期检查并及时排除。（ ）

（标准答案：对）

6、大型仪器使用中，应注意仪器设备的接地、电磁辐射、网络等安全事项，避免事故发生。（ ）

（标准答案：对）

7、实验室内的电线、开关、灯头、插头、插座等一切电器用具，要经常检查是否完好，有无漏电、潮湿、霉烂等情况。一旦有问题应立即报修。（ ）

（标准答案：对）

8、可以用潮湿的手碰开关、电线和电器。（ ）

（标准答案：错）

9、当手、脚或身体沾湿或站在潮湿的地板上时，切勿启动电源开关和触摸电气用具。（ ）

（标准答案：对）

10、在实验室同时使用多种电气设备时，其总用电量和分线用电量均应小于设计容量。（ ）

（标准答案：对）

11、不使用绝缘损坏或接地不良的电气设备。（ ）

（标准答案：对）

12、负载处于工作状态时，可以插、拔、接电气线路。（ ）

（标准答案：错）

13、接线时，要用合格的电源线，电源插头、插座。电源线接头要用绝缘胶布包好。（ ）

（标准答案：对）

14、可以用湿布擦电源开关。（ ）

（标准答案：错）

15、进行电气维修必须先关掉电源,在设置告知牌后，方可进行。（ ）

（标准答案：对）

16、实验室的电源总闸没有必要每天离开时都关闭，只要关闭常用电气的电源即可。（ ）

（标准答案：错）

17、电源插座附近不应堆放易燃物等杂物。（ ）

（标准答案：对）

18、移动某些非固定安装的电气设备时(如电风扇，照明灯)，可以不必切断电源。（ ）

（标准答案：错）

19、任何电气设备在未验明无电时，一律认为有电，不能盲目触及。（ ）

(标准答案：对)

20、当断线落地或大电流从接地装置流入大地时，若人站在附近则可能在两脚之间产生跨步电压。()

(标准答案：对)

21、使用电气设备时可以用两眼插头代替三眼插头。()

(标准答案：错)

22、人体触电致死，是由于肝脏受到严重伤害。()

(标准答案：错)

23、一定强度的电场，磁场，电磁场都可能对人有损害。()

(标准答案：对)

24、在遇到高压电线断落地面时，导线断落点 20 米内，禁止人员进入。如果不慎在此范围内，应背朝电线断落点，采用单脚跳或双脚并跳，撤离现场。()

(标准答案：对)

25、计算机使用完毕后，应将显示器的电源关闭，以避免电源接通，产生瞬间的冲击电流。()

(标准答案：对)

26、触电事故是因电流流过人体而造成的。()

(标准答案：对)

27、为了预防电击（触电），电气设备的金属外壳须接地，最好是埋设接地电阻很小专用地线。()

(标准答案：对)

28、为保证安全用电，配电箱内所用的保险丝应该尽量粗。()

(标准答案：错)

29、在照明电路上可以不用安装漏电保护器。()

(标准答案：错)

32、为方便进出专人管理的设备房间，可自行配制钥匙。（ ）

（标准答案：错）

33、实验结束后，应该打扫卫生、整理或运走废弃的试样或物品。（ ）

（标准答案：对）

34、国家秘密载体是指以文字、数据、符号、图形、图像、声音等方式记载国家秘密信息的纸介质、磁介质、光盘等各类物品。磁介质载体包括计算机硬盘、软盘和录音带、录像带等。（ ）

（标准答案：对）

35、禁止邮寄属于国家秘密的文件、资料和其他物品出境，禁止非法携运属于国家秘密的文件、资料和其他物品出境。（ ）

（标准答案：对）

36、实验室应保持整洁有序，不准喧哗、打闹、抽烟。（ ）

（标准答案：对）

37、学生进入实验室学习、工作前应接受安全教育、培训，并通过考核。（ ）

（标准答案：对）

38、进入化学、化工、生物、医学类实验室，可以不穿实验服。（ ）

（标准答案：错）

39、可将食物储藏在实验室的冰箱或冷柜内。（ ）

（标准答案：错）

40、实验结束后，要关闭设备，断开电源，并将有关实验用品整理好。（ ）

（标准答案：对）

41、从事特种作业（如电工、焊工、辐射、病原微生物等）的人员，必须接受相关的专业培训，通过考核并持有相应的资质证书才能上岗。（ ）

（标准答案：对）

42、节假日或假期在实验室做实验必须经课题组组长批准，并报综合办公室备案。（ ）

(标准答案：对)

43、实验室内可以堆放个人物品。()

(标准答案：错)

44、实验室内可以使用电炉、微波炉、电磁炉、电饭煲等取暖、做饭。()

(标准答案：错)

45、实验室内禁止抽烟、进食。()

(标准答案：对)

46、可以在粉尘操作区饮食及吸烟。()

(标准答案：错)

47、发现被盗或人为破坏，应保护现场并立即报告综合办公室负责人。()

(标准答案：对)

48、实验室发生非火灾类事故，应立即报告单位负责人和综合办公室，设立警戒区并撤离无关人员，以减轻潜在危害。()

(标准答案：对)

49、化学废液要回收并集中存放，不可倒入下水道。()

(标准答案：对)

50、学生进入实验室首先要了解实验室的安全注意事项。()

(标准答案：对)

51、未经允许不得随意拆卸实验仪器和设备。()

(标准答案：对)

52、实验进行前要了解实验仪器的使用说明及注意事项，实验过程中要严格按照操作规程进行操作。()

(标准答案：对)

53、实验仪器使用时要有人在场，不得擅自离开。()

(标准答案：对)

54、离开实验室前应检查门、窗、水龙头是否关好，通风设备、饮水设施、计算机、空调等是否已切断电源。（ ）

（标准答案：对）

55、不能将实验室易燃易爆物品带出实验室。（ ）

（标准答案：对）

56、有易燃易爆危险品的实验室禁止使用明火。（ ）

（标准答案：对）

57、在不影响实验室周围的走廊通行的情况,可以堆放仪器等杂物。（ ）

（标准答案：错）

58、只要不影响实验，可以在实验室洁净区域铺床睡觉。（ ）

（标准答案：错）

59、实验室内不得停放自行车、电动车、汽车。（ ）

（标准答案：对）

60、机械温控冰箱可以存放易燃易爆的化学品。（ ）

（标准答案：错）

61、在使用高压灭菌锅、烤箱等高压加热设备时，必须有人值守。（ ）

（标准答案：对）

62、为了防止盗窃事件的发生，临时离开实验室必须关门。（ ）

（标准答案：对）

63、实验室气体钢瓶必须用铁链、钢瓶柜等固定，以防止倾倒引发安全事故。

（ ）

（标准答案：对）

64、因为实验需要，可以在实验室存放大量气体钢瓶。（ ）

（标准答案：错）

65、实验废弃物应分类存放，及时送化学废弃物仓库，最后由所里联系有资质的公司进行处理。（ ）

(标准答案：对)

66、实验室不得乱拉电线，套接接线板。()

(标准答案：对)

67、空调电源必须单独拉线，不得使用接线板。()

(标准答案：对)

68、实验室内可以使用木制配电板、闸刀开关、花线电线。()

(标准答案：错)

69、实验室应将相应的规章制度和操作规程挂到墙上或便于取阅的地方。()

(标准答案：对)

70、实验室门口应挂上写有安全责任人的姓名和联系方式的牌子。()

(标准答案：对)

71、不得在冰箱、烘箱等加热、产热设备附近放置纸板、化学试剂、气体钢瓶等物品。()

(标准答案：对)

72、遇到停电停水等情况，实验室人员必须检查电源和水源是否关闭，避免重新来电来水时发生相关安全事故。()

(标准答案：对)

73、废弃的放射源，不得私自处理。()

(标准答案：对)

74、实验室人员必须定期检查设备、水电线路、门窗等是否完好，如发现问题，必须及时进行维修。()

(标准答案：对)

75、普通实验室内，不得私自饲养实验动物()

(标准答案：对)

76、不得堵塞实验室逃生通道。()

(标准答案：对)

77、实验室钥匙的配发由实验室负责人管理，不得私自配置钥匙或借给他人使用。（ ）

（标准答案：对）

78、实验室内电源根据需要可自行拆装、改线。（ ）

（标准答案：错）

79、除非特殊需要并采取一定的安全保护措施，否则空调、计算机、饮水机等不得无人开机过夜。（ ）

（标准答案：对）

80、不得带着实验防护手套开门、翻阅书籍、使用电脑。（ ）

（标准答案：对）

81、仪器设备发生故障后，必须及时报告管理人员，并详细登记。（ ）

（标准答案：对）

82、实验室冰箱内不得混放容易产生放热反应的化学品。（ ）

（标准答案：对）

83、易燃、易爆气体和助燃气体（氧气等）的钢瓶不得混放在一起，并应远离热源和火源，保持通风。（ ）

（标准答案：对）

84、上网信息的保密管理坚持“谁上网谁负责”的原则。（ ）

（标准答案：对）

85、任何单位和个人不得在电子公告系统、聊天室、网络新闻组上发布、谈论和传播国家秘密信息。（ ）

（标准答案：对）

86、与工作无关的外来人员不得进入实验室。（ ）

（标准答案：对）

87、实验室内彼此保持安静，不得进行娱乐活动。（ ）

（标准答案：对）

88、实验室科研教学活动中产生和排放的废气、废液、固体废物、噪声、放射性等污染物，应按环境保护行政主管部门的要求进行申报登记、收集、运输和处置。严禁把废气、废液、废渣和废弃化学品等污染物直接向外界排放。（ ）

（标准答案：对）

89、烘箱、微波炉、电磁炉、饮水加热器、灭菌锅等高能电器设备的放置地点应远离易燃、易爆物品。同时，规范操作，避免饮水加热器、灭菌锅等无水干烧。（ ）

（标准答案：对）

90、建立健全安全管理规章制度，完善逐级安全责任制，贯彻执行“谁使用，谁管理”、“谁主管，谁负责”的安全工作原则。（ ）

（标准答案：对）

91、应增强信息安全的意识，注意保护教学科研活动中实验技术参数、观测数据、实验分析结果及新的科学发现等资料。（ ）

（标准答案：对）

92、要加强实验室排污处理装置（系统）的建设和管理，做到达标排放。实验废弃物不得倒入自来水下水道或普通垃圾箱等处。（ ）

（标准答案：对）

93、实验室必须妥善保管消防器材和防盗装置，并定期检查。消防器材不得移作它用，周围禁止堆放杂物。（ ）

（标准答案：对）

94、实验室安全与卫生检查内容主要包括实验室布置、卫生、水电安全、冰箱与烘箱使用管理、危险品使用与保管、化学与生物废弃物（气、液、固态物）的处置、排污管理、气体钢瓶安全、放射性安全等。（ ）

（标准答案：对）

95、各部门每季度组织有关人员对实验室进行安全与卫生管理的例行检查，记录检查情况，提出存在的问题并限时整改。每次检查结束后须将检查结果形成报告，上报综合办公室。（ ）

（标准答案：对）

96、实验室如发现存在安全隐患，要及时向所在部门和实验室负责人、综合办公室报告，并采取措施进行整改。对安全隐患隐瞒不报或拖延上报的，研究所将对相关责任人进行严肃处理。（ ）

（标准答案：对）

97、可以将无毒无害试剂当作有毒有害试剂处理。（ ）

（标准答案：错）

98、高压钢瓶可以没有固定设施，可以使用过期、未经检验和不合格的气瓶。（ ）

（标准答案：错）

99、涉及生物安全性的动物实验，都必须在相应级别的生物安全实验室内进行。

（ ）

（标准答案：对）

100、一般的实验室只要干净、卫生情况良好，就可以饲养动物或进行动物实验。

（ ）

（标准答案：错）

101、实验动物是进行生命科学研究基本的材料和对象，它的质量关系到研究结果和成功率。因此，实验动物应该来源于具备资质的单位。（ ）

（标准答案：对）

102、无论是否涉及病原微生物的实验动物尸体，都要进行无害化处理及冷冻保存，然后送具备相关资质的机构处理。（ ）

（标准答案：对）

103、《中华人民共和国传染病防治法》由中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议于 2004 年 8 月 28 日修订通过。（ ）

(标准答案: 对)

104、加强对实验动物管理工作,防止人畜共患病和动物传染病的发生,是搞好生物安全管理工作的根本目标。()

(标准答案: 对)

105、废弃的利器(包括针头、小刀、金属和玻璃等)应直接弃置于耐扎容器内。()

(标准答案: 对)

106、液体和固体实验废弃物不需分开放置。()

(标准答案: 错)

107、一些低毒、无毒的实验废液可以不经处理,直接由下水道排放。()

(标准答案: 错)

108、实验室地面出现溢水的主要原因之一是忘记关闭水龙头,尤其停水时忘关水龙头,因此离开实验室时要认真检查。()

(标准答案: 对)

109、夏季天气热时可以在实验室内穿露有脚趾的鞋。()

(标准答案: 错)

110、离开实验室时,实验服不得穿着外出,必须脱下并留在实验室内,更不能携带回家。()

(标准答案: 对)

111、未经指导教师许可,不得搬弄仪器、设备,以及擅自开始实验。实验时,应注意安全,按要求操作,如发现异常立即停止。()

(标准答案: 对)

112、在开放实验室,外来人员可随便操作实验室仪器设备。()

(标准答案: 错)

113、实验室安全与卫生工作应坚持“安全第一,预防为主”的原则。()

(标准答案: 对)

114、有关涉密的文件、资料的制作、保管建立病毒防护系统后可上网。（ ）

（标准答案：错）

115、实验室的接线板远离可能有水的位置和高温环境。（ ）

（标准答案：对）

116、红外灯、紫外灯不得安装在木柜或纸箱中使用。（ ）

（标准答案：对）

117、电炉、烘箱等用电设备在使用中，使用人员不得离开。（ ）

（标准答案：对）

118、剧毒品管理应严格遵守“五双”制度(即“双人保管、双人收发、双人使用、双人运输、双人双锁”),精确计量和记录剧毒品的使用情况,防止被盗、丢失、误领、误用。如发现问题应立即报告综合办公室、财务与资产处和当地公安部门。

（ ）

（标准答案：对）

119、使用电子门禁的大楼和实验室,应对各类人员设置相应的级别,对于门禁卡丢失、人员调动或离所等情况应及时采取措施,办理报失或移交手续。（ ）

（标准答案：对）

120、涉辐人员必须持有辐射安全与防护培训合格证书,并佩戴个人剂量计进行实验。（ ）

（标准答案：对）

121、涉源单位产生放射性废源废物要及时送贮(一般3个月内),按规定处置,不得直接排入下水道或混装到普通垃圾中。（ ）

（标准答案：对）

122、辐射工作场所的入口处可以不必放置辐射警示标志和工作信号。（ ）

（标准答案：错）

123、所有操作或接触放射性核素的实验室人员应接受放射性基础知识、相关技术和放射性防护的指导和培训。实行持证上岗，并佩戴个人专用的辐射剂量计。

()

(标准答案：对)

124、同位素实验室和使用固定放射源实验室要在明显位置张贴放射警示标志。定期检测放射污染情况，严防射线污染超标。()

(标准答案：对)

125、铸造实习期间不准穿凉鞋、拖鞋，不准穿短裤，女生不准穿裙子。()

(标准答案：对)

126、不准在车间打闹，不准随意攀登吊车、墙梯或者其它设备，不准在吊车吊运物体运行线上行走或停留。()

(标准答案：对)

127、实验室应对仪器设备加强维护保养,定期校验和检修。()

(标准答案：对)

128、因实验需要，仪器设备可以随便拆装。()

(标准答案：错)

129、电气设备和大型仪器须接地良好，对电线老化等隐患要定期检查并及时排除。()

(标准答案：对)

130、用手搬运重物时，应先以半蹲姿势，抓牢重物，然后用腿肌出力站起，切勿弯腰，以防伤及背部和腰。()

(标准答案：对)

131、人工呼吸的方法是捏紧伤者鼻孔，深吸一口气后紧贴伤者的口向口内吹气，时间约为 2 秒钟，吹气完毕后，立即松开伤者的鼻孔，让他自行呼气，时间约 3 秒钟。如此以每分钟约 12 次的速度进行。()

(标准答案：对)

132、胸外心脏挤压法：救护者跪在触电者一侧或骑跪在其腰部两侧，两手相迭，手掌根部放在伤者心窝上方、胸骨下，掌根用力垂直向下挤压，压出心脏里面的血液，挤压后迅速松开，胸部自动复原，血液充满心脏，以每分钟 60 次速度进行。（ ）

（标准答案：对）

133、心脏骤停者应立即行胸外心脏按摩术，同时拨打 120。现场抢救成功的心肺复苏患者或重症患者，如昏迷、惊厥、休克、深度青紫等，应立即送医院治疗。（ ）

（标准答案：对）

134、强酸灼伤时，必须先用大量流水彻底冲洗，然后在皮肤上擦拭碱性药物，否则会加重皮肤损伤。（ ）

（标准答案：对）

135、碱灼伤时，必须先用大量流水冲洗至皂样物质消失，然后可用 1%~2% 醋酸或 3% 硼酸溶液进一步冲洗。（ ）

（标准答案：对）

136、护送病人时，应取掉口中异物，采用平卧位，头部稍低，保持呼吸畅通。（ ）

（标准答案：对）

137、发生意外后先对伤员进行必要的止血、包扎、固定等处理，然后尽可能用担架搬运，搬运时病人始终处脚朝前，头朝后，以便于随时观察伤者情况变化，及时实施急救处理。（ ）

（标准答案：对）

138、急救时伤口包扎越紧越好。（ ）

（标准答案：错）

139、急救时伤口包扎松劲适度，不可过紧或过松，以防滑脱或压迫神经和血管，影响远端血液循环，甚至造成肢体坏死。（ ）

(标准答案: 对)

140、某人因机械操作不慎,致使左手食指从指根完全离断,急救处理首先是找器皿保存断指,然后包扎残端伤口止血。()

(标准答案: 错)

141、实施急救的顺序:若有呼吸心跳停止的,先行复苏,然后是止血、包扎、骨折固定或脱臼复位(固定)、搬运。()

(标准答案: 对)

142、火或热水等引起的小面积烧伤、烫伤,必须用冷水冲洗 30 分钟以上,然后用烧伤膏涂抹,切不可用牙膏、酱油、盐等覆盖。()

(标准答案: 对)

143、火或热水等引起的大面积烧伤、烫伤,必须用湿毛巾、湿布、湿棉被覆盖,然后送医院进行处理。()

(标准答案: 对)

144、触电时,不可人去拉(可用木棒把伤员挑开),应立即切断电源,然后先做人工呼吸,再做心脏按压,同时报 120 送医院进行处理。()

(标准答案: 对)

145、突发性不可抗拒的雷电、水灾、地震、房屋垮塌等自然灾害事故发生后,应在领导小组的指挥下,马上组织疏散、抢救现场工作人员或进行人员自助自救,以确保人员的人身安全,作好善后工作。()

(标准答案: 对)

146、实验中遇到一般割伤,应立即取出伤口内的异物,保持伤口干净,并用酒精棉清除伤口周围的污物,涂上外伤膏或消炎粉。()

(标准答案: 对)

147、实验中遇到严重割伤,可在伤口上部 10cm 处用沙布扎紧,减慢流血,并立即送医院。()

(标准答案: 对)

148、实验中遇到一般烫伤和烧伤，不要弄破水泡，在伤口处用 95%的酒精轻涂伤口，涂上烫伤膏或涂一层凡士林油，再用纱布包扎。（ ）

（标准答案：对）

149、如溴滴落到皮肤上，应立即用水冲洗，再用 1 体积 25%的氨水，1 体积松节油和 10 体积（75%）酒精混合液涂敷；也可先用苯甘油除去溴，然后用水冲洗。（ ）

（标准答案：对）

150、如酚灼伤皮肤，先用浸了甘油或聚乙二醇和酒精混合液（7：3）的棉花除去污物，用清水冲洗干净，然后用饱和硫酸钠溶液湿敷。但不可用水直接冲洗污物，否则有可能使创伤加重。（ ）

（标准答案：对）

151、实验中溅入口中而尚未下咽的毒物，应立即吐出，并用大量水冲洗口腔。（ ）

（标准答案：对）

152、溅入口中已下咽的毒物，应根据毒物的性质服解毒剂，并立即送医院。（ ）

（标准答案：对）

153、溅入口中已下咽的强酸，先饮用大量水，再服用氢氧化铝膏，鸡蛋清。（ ）

（标准答案：对）

154、溅入口中已下咽的强碱，先饮用大量水，再服用乙酸果汁，鸡蛋清。（ ）

（标准答案：对）

155、不论误食酸或碱，都可以灌注牛奶，不要吃呕吐剂。（ ）

（标准答案：对）

156、如遇刺激性及神经性中毒，先服牛奶或鸡蛋白使之缓和，再服用硫酸铜溶液（30g 溶于一杯水中）催吐。也可以用手指伸入喉部催吐后，立即送往医院。

（ ）

（标准答案：对）

157、如遇呼吸道吸进有毒气体、蒸气、烟雾而引起呼吸系统中毒时，应立即将病人移至室外空气新鲜的地方，解开衣领，使之温暖和安静，切勿随便进行人工呼吸。（ ）

（标准答案：对）

158、因吸入少量氯气、溴蒸气而中毒，可用碳酸氢钠溶液漱口，不可进行人工呼吸。（ ）

（标准答案：对）

159、实验室人员发生触电时，应迅速切断电源，将触电者上衣解开，取出口中异物，然后进行人工呼吸。当患者恢复呼吸时，应立即送医院。（ ）

（标准答案：对）

160、当有人发生触电事故时，应马上直接将其拉开。（ ）

（标准答案：错）

161、发现有人触电，应立即切断电源，不能直接拉触电者，应用木棒或其它绝缘物将人与带电体分离。（ ）

（标准答案：对）

162、雷电发生时，如果作业人员孤立处于暴露区时，应该立即双手抱膝下蹲，向前弯曲。（ ）

（标准答案：对）

163、在触电现场，若触电者已经没有呼吸或脉搏，此时可以判定触电者已经死亡，可以放弃抢救。（ ）

（标准答案：错）

164、触电紧急救护时，首先应使触电者脱离电源，然后立即进行人工呼吸、心脏按压。（ ）

（标准答案：对）

165、身边没有胶水胶棒时可以用口舔标签用以粘贴。（ ）

（标准答案：错）

166、危险废弃物是指有潜在的生物危险、可燃易燃、腐蚀、有毒、放射性的对人环境有害的一切废弃物。（ ）

（标准答案：对）

167、进行需要戴防护眼镜的实验时，戴隐形眼镜的近视者可不戴防护眼镜。（ ）

（标准答案：错）

168、在清洁、维修仪器时，应先断电并确保无人能开启仪器。（ ）

（标准答案：对）

169、安全事故处理应本着先人后物的原则，果断地、坚决地快速处置。（ ）

（标准答案：对）

170、实验过程中如发生事故，应冷静妥善地处理，尽量把事故解决在萌芽状态。如较为严重，有危及人身安全可能时，应及时撤离现场，并通知邻近实验室工作人员迅速撤离，尽快报警。（ ）

（标准答案：对）

171、做实验时要爱护实验设备，同时注意自身的安全，避免发生事故。（ ）

（标准答案：对）

172、学生、新员工进实验室之前要参加安全教育和培训，经培训、考核合格后方可进入实验室学习与工作；学生要在老师指导下开展实验研究。（ ）

（标准答案：对）

173、要保持实验室环境整洁，做到地面、桌面、设备三整洁，减少安全隐患。

（ ）

（标准答案：对）

174、实验室安全工作的中心任务是防止发生人员伤亡、财产和科研资料损失。

（ ）

（标准答案：对）

175、实验室发生安全事故的主要原因有：操作不慎、粗心大意、设施老化、缺少防护设施等。（ ）

(标准答案：对)

176、实验室安全事故的表现形式主要有：火灾、爆炸、中毒、灼伤、病原微生物感染、辐照和机电伤人等。()

(标准答案：对)

177、因实验室特殊要求，细胞培养房内用的气体钢瓶可不用固定，只要平时小心就可以。()

(标准答案：错)

178、因实验室特殊要求，细胞培养房内用的气体钢瓶可用小推车等形式进行固定。()

(标准答案：对)

179、正在进行实验时，可带着防护手套接听电话。()

(标准答案：错)

180、发生各类案件时应立即报案，妥善保护案发现场，若有人受伤，在救人时应尽可能记住现场破坏前的情况(如手机拍照等)。()

(标准答案：对)

181、实验时,禁止用口吸方式移液。()

(标准答案：对)

182、针头、玻璃、一次性手术刀等利器应在使用后放在耐扎容器中，尖利物容器应在内容物达到三分之二前进行置换处置。()

(标准答案：对)

183、使用过的实验服脱下后，不得与日常衣服放在一起，也不得放在洁净区域。()

(标准答案：对)

184、在使用微波炉时，可以使用金属容器以及空载。()

(标准答案：错)

185、及时淘汰老化、性能不稳又具有安全隐患的仪器设备(如冰箱 10 年以上，烘箱 12 年以上)。()

(标准答案：对)

186、早晨、中饭、晚上等几个人员稀少的时间段，要特别注意随手关门，确保实验室财产和个人物品的安全。()

(标准答案：对)

187、教师应学习研究有关实验室安全的知识，同时在理论教学和实验中对学生
进行安全知识教育、教会学生如何正确使用实验设备和实验操作，教会学生在突
发事故发生时如何自我保护、相互救援、安全撤离。()

(标准答案：对)

188、在实验室发生事故时，现场人员应迅速组织、指挥，切断事故源，尽量阻
止事态蔓延、保护现场；及时有序地疏散学生等人员，对现场已受伤人员作好自
助自救、保护人身及财产。()

(标准答案：对)

189、接触化学危险品、剧毒以及致病微生物等的仪器设备和器皿，必须有明确
醒目的标记。使用后及时清洁，特别是维修保养或移至到其他场地前，必须进行
彻底的净化。()

(标准答案：对)

190、饮水加热器、灭菌锅等可以无水干烧。()

(标准答案：错)

191、有“严禁烟火”警示牌的大楼和实验室，可不必配置必要的消防、冲淋、洗
眼、报警和逃生设施和有明显标志。()

(标准答案：错)

192、测试数据应进行异地备份。()

(标准答案：对)

193、使用 U 盘拷贝资料，应先对 U 盘杀毒，防止病毒感染。()

(标准答案: 对)

194、创造安全、卫生的实验室工作环境, 仅仅是实验工作人员的责任。()

(标准答案: 错)

195、加强计算机的安全管理, 建立病毒防护系统并不断加以更新, 重要的数据资料应定期进行备份。()

(标准答案: 对)

196、使用激光扫描仪预览和扫描资料时, 可以不盖上扫描仪盖子。()

(标准答案: 错)

197、抗菌剂不能够杀死微生物, 只能抑制它们生长和繁殖。()

(标准答案: 对)

198、病原微生物的研究工作必须在生物安全一级(BSL-1)、二级(BSL-2)、三级(BSL-3)和四级(BSL-4)实验室中进行。()

(标准答案: 对)

200、生物类实验室废弃物(包括动物残体等), 可以丢弃在普通垃圾箱内。()

(标准答案: 错)

201、生物实验中的一次性手套及沾染EB致癌物质的物品, 可以丢弃在普通垃圾箱内。()

(标准答案: 错)

202、为了确保动物实验的正常开展, 应严格控制无关人员、昆虫及野生动物、病原微生物进入实验室。()

(标准答案: 对)

203、生物废弃物应置于专用的、有标记的容器内。()

(标准答案: 对)

204、有毒实验废弃物应明确专人负责，使用专用容器和醒目标识，将重金属、氰化物、溴化乙啶（EB）及其结合物进行分类收集，专人管理，定期回收，统一处理。（ ）

（标准答案：对）

205、因运动量过度产生的酸疼，可以通过减量、休息、按摩、热敷等方法来帮助机体积极恢复。（ ）

（标准答案：对）

206、从自己的实际情况出发，锻炼要循序渐进，不要急于求成，应做自己力所能及的动作。锻炼时间不宜过长，练习负荷不宜过重，以免过度疲劳或发生运动损伤。（ ）

（标准答案：对）

207、运动锻炼时不能佩戴纪念章，不能携带小刀、钥匙、别针和其它尖利或硬质物体等物件，并要换上运动鞋、运动服等。（ ）

（标准答案：对）

208、自然地形跑步时要注意做好缓冲动作，用全脚掌先着地，后蹬程度和前摆高度要小一些。（ ）

（标准答案：错）

209、以下情况不宜进行游泳锻炼：患心脏病、高血压、肺结核和身体虚弱的人；严重沙眼、传染性皮肤病、细菌性肠炎等人；病刚好或发烧头疼、伤风感冒、过度疲劳、饥饿时；饭后 45—60 分钟和剧烈运动后不久；女生月经期不宜下水。（ ）

（标准答案：对）

210、体育运动中的安全防范措施多种多样：进行器材锻炼时一定要有人保护；向前摔倒时顺势作前滚翻，不要用手撑地；向后摔倒时，让身体自然倒地，不要用手撑地，顺势作后滚翻。（ ）

（标准答案：对）

212、人患感冒以后，可以通过激烈的体育锻炼使身体出汗，进而治病。（ ）

（标准答案：错）

213、利用江河水域进行游泳锻炼时，要事先了解水域的水温，漩涡，水流，深水区、浅水区，水底水中情况等。（ ）

（标准答案：对）

214、女生月经期间，可以参加适当的体育活动，如慢跑，打乒乓球、羽毛球、排球，舞蹈等运动负荷不大的活动。（ ）

（标准答案：对）

215、出现肌肉痉挛（抽筋），常见的缓解法是拉长痉挛的肌肉，同时配合局部按摩和点压穴位等方法促进缓解。（ ）

（标准答案：对）

216、出现内伤如挫伤、肌肉拉伤、关节扭伤、滑囊炎、腱鞘炎等 24 小时内一般用冷敷，加压包扎，抬高受伤的肢体等方法，尽可能减少受伤部位的出血。（ ）

（标准答案：对）

217、血压升高，目光无神，情绪烦躁，面色苍白等，如果是因锻炼造成的，则都是运动不足的征兆。（ ）

（标准答案：错）

218、剧烈运动后，不要立刻大量饮水、吃冷饮，也不要立即洗冷水澡。（ ）

（标准答案：对）

219、肥胖产生的原因是由于进食过多，消耗过少，使摄入的热量超过了机体所消耗的热量，过多的热量在体内转变成脂肪并大量蓄积，造成脂肪组织异常增加所致。（ ）

（标准答案：对）

220、体育锻炼的负荷量无论是强度、时间还是密度都要因人、因时而异，应根据自身的实际情况安排运动负荷。（ ）

(标准答案：对)

221、脑震荡急救时，应让伤员平卧、安静，不可坐起或站立。头部可冷敷，身上保暖。若有昏迷现象者可掐人中、内关穴；如若呼吸发生障碍，可施行人工呼吸。()

(标准答案：对)

222、轻微的肌肉拉伤或少量的肌肉纤维的断裂，应立即冷敷，局部加压包扎，抬高肢体。()

(标准答案：对)

223、踝关节韧带扭伤以后立即冷敷，加压包扎固定。()

(标准答案：对)

224、对酸痛的肌肉冷敷有助于损伤组织的修复及痉挛的缓解。()

(标准答案：错)

225、实验室发生火警、火灾时，应立即采取措施灭火，并报综合办公室或 119。

()

(标准答案：对)

226、发现实验室楼的配电箱起火，可以用楼内的消火栓放水灭火。()

(标准答案：错)

227、二氧化碳灭火器使用不当，可能会造成冻伤。()

(标准答案：对)

228、在附近无水源，身上着火来不及脱衣服时，应就地打滚，将火苗压灭进行自救。()

(标准答案：对)

229、消防队在扑救火灾时，有权根据灭火的需要，拆除或者破损临近火灾现场的建筑。()

(标准答案：对)

230、液体着火时，应用灭火器灭火，不能用水扑救或其它物品扑打。()

(标准答案：对)

231、建筑物发生火灾时，乘坐电梯疏散即快速又安全省力。()

(标准答案：错)

232、消防工作的方针是：“预防为主，防消结合”，实行消防安全责任制。()

(标准答案：对)

233、使用手提灭火器时，拨掉保险销，对准着火点根部用力压下压把，灭火剂喷出，就可灭火。()

(标准答案：对)

234、若被火场浓烟所困，应迅速起身跑出火场。()

(标准答案：错)

235、实验室应配备相应的消防器材。参加实验人员要熟悉其存放位置及使用方法并掌握有关的灭火知识。()

(标准答案：对)

236、实验室必须配备符合本室要求的消防器材，消防器材要放置在明显或便于拿取的位置。严禁任何人以任何借口把消防器材移作它用。()

(标准答案：对)

237、当发生火情时尽快沿着疏散指示标志和安全出口方向迅速离开火场。()

(标准答案：对)

238、大火封门无路可逃时，可用浸湿的被褥、衣物堵塞门缝，向门上泼水降温，以延缓火灾蔓延时间，呼叫待援。()

(标准答案：对)

239、爆炸是指物质瞬间突然发生物理或化学变化，同时释放出大量的气体和能量（光能、热能、机械能）并伴有巨大声响的现象。()

(标准答案：对)

240、实验室一旦发生起火，不要惊慌失措，应利用消防器材，采取有效措施控制、扑灭火灾。()

(标准答案：对)

241、火灾发生后，千万不要盲目跳楼，可利用疏散楼梯、阳台、窗口等逃生自救。也可用绳子或把床单、被套等撕成条状连成绳索，紧拴在窗框、铁栏杆等可靠的固定物上，用毛巾、布条等保护手心，顺绳滑下，或下到未着火的楼层进行逃生。()

(标准答案：对)

242、当可燃烧液体呈流淌状燃烧时，应将灭火剂的喷流对准火焰根部由近而远并左右扫射，向前快速推进，直至火焰扑灭。()

(标准答案：对)

243、如果可燃液体在容器内燃烧时，应从容器的一侧上部向容器中喷射但注意不能将喷流直接喷射在燃烧液面上，防止灭火剂的冲力将可燃液体冲出容器而扩大火势。()

(标准答案：对)

244、扑救气体火灾切忌盲目扑灭火势，首先应切断火势蔓延途径，然后疏散火势中压力容器或受到火焰辐射热威胁的压力容器，不能疏散的部署水枪进行冷却保护。()

(标准答案：对)

245、扑救毒害性、腐蚀性或燃烧产物毒害性较强的火灾时，必须配戴防护面具。()

(标准答案：对)

246、火灾发生后，穿过浓烟逃生时，必须尽量贴近地面，并用湿毛巾捂住口鼻。()

(标准答案：对)

247、火灾发生后，受到火势威胁时，要当机立断披上浸湿的衣物、被褥等向安全出口方向冲去。()

(标准答案：对)

248、火灾发生后，当所有的逃生线路被大火封锁时，应立即退回室内，用手电筒、挥舞衣物、呼叫等方式向窗外发送求救信号，等待救援。（ ）

（标准答案：对）

249、隔离灭火法是将可燃物与引火源或氧气隔离开来，可防止火势继续扩大。（ ）

（标准答案：对）

250、冷却灭火法是将可燃物冷却到其燃点以下，停止燃烧反应。（ ）

（标准答案：对）

251、水具有导电性，不宜扑救带电设备的火灾，不能扑救遇水燃烧物质或非水溶性燃烧液体的火灾。（ ）

（标准答案：对）

252、灭火器按其移动形式可分为：手提式和推车式。（ ）

（标准答案：对）

253、电气设备发生火灾时，应注意：1、电气设备可能带电，可能发生触电事故；2、某些电气设备充有大量的油，可能发生喷油甚至爆炸。（ ）

（标准答案：对）

254、在熟睡时，听到火警信号后正确的做法是：1、用手试一试门是否热，如是冷的，可开门逃生；2、准备好湿毛巾；3、切勿随意跳楼，自制救生绳索后再设法安全着落；4、利用自然条件作为救生滑道。（ ）

（标准答案：对）

255、在室外灭火时，应站在上风位置。（ ）

（标准答案：对）

256、灭火的四种方法是隔离法、窒息法、冷却法、化学抑制法。（ ）

（标准答案：对）

257、单位消防安全制度主要包括以下内容：消防安全教育、培训；防火巡查、检查；安全疏散设施管理；消防（控制室）值班；消防设施、器材维护管理；火

灾隐患整改；用火、用电安全管理；易燃易爆危险物品和场所防火防爆；专职和义务消防队的组织管理；灭火和应急疏散预案演练；燃气和电气的检查管理（包括防雷、防静电）；消防安全工作考评和奖惩；其他必要的消防安全内容。（ ）

（标准答案：对）

258、仪器设备用电或线路发生故障着火时，应立即切断现场电源，将人员疏散，并组织人员用灭火器进行灭火。（ ）

（标准答案：对）

259、火灾对实验室构成的威胁最为严重，最为直接。应加强对火灾三要素（易燃物、助燃物、点火源）的控制。（ ）

（标准答案：对）

260、实验室常用的灭火方法：用水灭火、砂土灭火、灭火器。（ ）

（标准答案：对）

261、实验大楼因出现火情发生浓烟时应迅速离开，当浓烟已穿入实验室内时，要沿地面匍匐前进，因地面层新鲜空气较多，不易中毒而窒息，有利于逃生。当逃到门口时，千万不要站立开门，以避免被大量浓烟熏倒。（ ）

（标准答案：对）

262、实验室内出现火情逃到室外走廊时，要尽量做到随手关门，这样一来可阻挡火势随人运动而迅速蔓延，增加逃生的有效时间。（ ）

（标准答案：对）

263、实验大楼出现火情时千万不要乘电梯，因为电梯可能因停电或失控，同时又因“烟囱效应”，电梯井常常成为浓烟的流通道。（ ）

（标准答案：对）

264、实验室内出现火情，若被困在室内时，应迅速打开水龙头，将所有可盛水的容器装满水，并把毛巾打湿。用湿毛巾捂嘴，可以遮住部分浓烟不被吸入。（ ）

（标准答案：对）

265、实验室灭火的方法要针对起因选用合适的方法。一般小火可用湿布、石棉布或沙子覆盖燃烧物即可灭火。（ ）

（标准答案：对）

266、电气线路着火，要先切断电源，再用干粉灭火器或二氧化碳灭火器灭火，不可直接泼水灭火，以防触电或电气爆炸伤人。（ ）

（标准答案：对）

267、电气设备着火时，可以用水扑灭。（ ）

（标准答案：错）

268、被困在电梯中应尽快扒开门脱险。（ ）

（标准答案：错）

269、燃烧必须具备可燃物、助燃物和点火源三大条件，缺一不可。因此，可以采取尽量隔离的方式来防止实验室火灾的发生。（ ）

（标准答案：对）

270、引起电器线路火灾的原因是：（ ）

- A. 短路
- B. 电火花
- C. 负荷过载
- D. 以上都是

（标准答案：D）

271、进行照明设施的接电操作，应采取的防触电措施为：（ ）

- A. 湿手操作
- B. 切断电源
- C. 站在金属登子或梯子上
- D. 戴上手套

（标准答案：B）

274、万一发生电气火灾，首先应该采取的第一条措施是：（ ）

- A. 打电话报警
- B. 切断电源
- C. 扑灭明火
- D. 求援

（标准答案：B）

276、造成触电事故的因素是：（ ）

- A. 电流流过人体
- B. 电压
- C. 电场
- D. 磁场

（标准答案：A）

277、静电电压最高可达?(?)?, 放电时易产生静电火花，引起火灾。（ ）

- A. 50 伏
- B. 上万伏
- C. 220 伏
- D. 380 伏

（标准答案：B）

278、金属梯子不适于以下什么工作场所？（ ）

- A. 带电作业的工作场所
- B. 坑穴或密闭场所
- C. 高空作业
- D. 静电

（标准答案：A）

279、电线插座损坏时，既不美观也不方便工作，并造成：（ ）

- A. 吸潮漏电
- B. 空气开关跳闸
- C. 触电伤害
- D. 以上都是

（标准答案：D）

280、国内民用照明电路电压为以下哪种？（ ）

- A. 直流电压 220 伏
- B. 交流电压 280 伏
- C. 交流电压 220 伏
- D. 交流电压 110 伏

（标准答案：C）

281、人体在电磁场作用下会受到不同程度的伤害，其原因是？（ ）

- A. 电流
- B. 电压
- C. 电磁波辐射
- D. 静电

（标准答案：C）

283、车间内的插座距地面的高度一般不低于多少米？（ ）

- A. 0.3 米
- B. 0.2 米
- C. 0.1 米
- D. 0.5 米

（标准答案：A）

284、漏电保护器对下列哪种情况不起作用？（ ）

- A. 单手碰到带电体
- B. 人体碰到带电设备
- C. 双手碰到两相电线（此时人体作为负载，已触电）
- D. 人体碰到漏电机壳

（标准答案：C）

286、用于饲养实验动物或进行动物实验的设施或部门，必须具备什么证明？（ ）

- A. 实验动物生产许可证
- B. 实验动物使用许可证
- C. 实验动物环境设施合格证
- D. 动物实验使用许可证

（标准答案：B）

290、实验室各种管理规章制度应该：（ ）

- A. 上墙或便于取阅的地方
- B. 存放在档案柜中
- C. 由相关人员集中保管
- D. 保存在计算机内

（标准答案：A）

291、使用办公自动化设备时，应当遵守下列规定：（ ）

- A. 不得在没有保密措施的传真机、计算机上传输或者处理涉及国家秘密的信息
- B. 使用计算机信息网络国际联网传输信息不得涉及国家秘密
- C. 未经原确定密级的国家机关、单位批准，不得复制国家秘密的信息；不得使用手机、无线话筒传达涉及国家秘密的信息
- D. 以上都是

（标准答案：D）

292、研究所对危险化学品废物的处理的工作原则是：（ ）

- A. 自行处理
- B. 分类收集、定点存放、专人管理、集中处理
- C. 当作生活垃圾处理
- D. 以上都不对

（标准答案：B）

293、由于行为人的过失引起火灾，造成严重后果，危害公共安全的行为，构成：

（ ）

- A. 纵火罪
- B. 失火罪
- C. 玩忽职守罪
- D. 重大责任事故罪

（标准答案：B）

294、对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须：（ ）

- A. 设置危险废物识别标志
- B. 设置生活垃圾识别标志
- C. 不用设置识别标志

（标准答案：A）

295、实验室安全管理实行哪种管理？（ ）

- A. 研究所、部门、实验室三级管理
- B. 研究所、部门两级管理
- C. 部门、实验室两级管理
- D. 实验室自行管理

（标准答案：A）

296、生产、经营、储存、运输、使用危险化学品的单位和处置废弃危险化学品的单位，其（ ）必须保证本单位危险化学品的安全管理符合有关法律、法规、规章的规定和国家标准，并对本单位危险化学品的安全负责。（ ）

- A.主要负责人
- B.技术人员，
- C.从业人员
- D.安全管理人员

（标准答案：A）

297、对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须：（ ）

- A. 设置危险废物识别标志
- B. 设置生活垃圾识别标志
- C. 不用设置识别标志

（标准答案：A）

298、化学药品存放室要有防盗设施，保持通风，试剂存放应：（ ）

- A. 按不同类别分类存放
- B. 大量危险化学品存放在实验室
- C. 可以存放在走廊上

（标准答案：A）

299、生物实验中的一次性手套及沾染 EB 致癌物质的物品，应：（ ）

- A. 丢弃在普通垃圾箱内
- B. 统一收集和处理
- C. 随意放在实验室

（标准答案：B）

300、实验室钥匙不得私自配置或给他人使用。钥匙的配发、管理由谁负责？（ ）

A.实验室负责人

B.指导教师

C.学生

(标准答案: A)

301、在实验室区域内,可以: ()

A. 吸烟、烹饪、用膳

B. 睡觉过夜和进行娱乐活动

C. 做与学习、工作有关的事情

(标准答案: C)

302、对常用的又是易制毒的试剂,应: ()

A. 放在试剂架上

B. 放在抽屉里,并由专人管理

C. 锁在实验室的试剂柜中,并由专人管理

(标准答案: C)

303、进行危险性实验时,应: ()

A. 单人操作

B. 必须要有一人以上

C. 必须要有一人

(标准答案: B)

306、废弃的有害固体药品,应: ()

A. 不经处理解毒后就丢弃在生活垃圾处

B. 经处理解毒后,才可丢弃在生活垃圾处

C. 收集起来由专业公司处理

(标准答案: C)

307、实验室、办公室等用电场所如需改装电路,以下说法正确的是? ()

- A. 老师自行改装
- B. 须经有关部门批准，并指派电工安装
- C. 学生可以私自改接

(标准答案: B)

308、随手使用的手纸、饮料瓶等垃圾应该如何处理? ()

- A. 扔桌子上
- B. 扔地上
- C. 交给老师
- D. 扔垃圾桶

(标准答案: D)

309、以下对放射性垃圾的安全管理不正确的是: ()

- A. 允许非放射性垃圾混入放射性垃圾
- B. 将放射性垃圾放入专用容器收集、包装、储存，由专业部门统一回收处理
- C. 严禁放射性垃圾放入非放射性垃圾
- D. 放射性垃圾和非放射性垃圾必须分开放置

(标准答案: A)

310、CO 是什么味? ()

- A. 酸味
- B. 烂苹果味
- C. 无味
- D. 臭鸡蛋味

(标准答案: C)

311、不会发生爆炸的是: ()

- A. 亚麻粉尘
- B. 砂尘
- C. 面粉

(标准答案: B)

312、具有下列哪些性质的化学品属于化学危险品: ()

- A. 爆炸
- B. 易燃、腐蚀、放射性
- C. 毒害
- D. 以上都是

(标准答案: D)

313、实验室存放化学品不得使用哪类冰箱? ()

- A. 机械温控冰箱
- B. 电子温控冰箱
- C. 防爆冰箱

(标准答案: A)

314、易燃液体加热时可以: ()

- A. 用电炉加热, 有人看管
- B. 用电热套加热可不用人看管
- C. 用水浴加热, 并有人看管
- D. 用水浴加热不用人看管

(标准答案: C)

315、发生危险化学品事故后,应该向什么方向疏散? ()

- A. 下风
- B. 上风
- C. 顺风

(标准答案: B)

316、进行危险物质、挥发性有机溶剂、特定化学物质或毒性化学物质等操作实验或研究,说法错误的是: ()

- A. 必须戴防护口罩
- B. 必须戴防护手套
- C. 必须戴防护眼镜
- D. 无所谓

(标准答案: D)

317、为避免误食有毒的化学药品, 以下说法正确的是: ()

- A. 可把食物、食具带进实验室
- B. 在实验室内可吃口香糖
- C. 使用化学药品后须先洗净双手方能进食
- D. 实验室内可以吸烟

(标准答案: C)

318、药品中毒的途径有哪些? ()

- A. 呼吸器官吸入
- B. 由皮肤渗入
- C. 吞入
- D. 以上都是

(标准答案: D)

319、下列粉尘中, 哪种粉尘可能会发生爆炸: ()

- A. 生石灰
- B. 面粉
- C. 水泥
- D. 钛白粉

(标准答案: B)

320、有机物或能与水发生剧烈化学反应的药品着火, 应用 , 以免扑救不当造成更大损害。 ()

- A. 其他有机物灭火
- B. 自来水灭火
- C. 灭火器或沙子扑灭

(标准答案: C)

321、能相互反应产生有毒气体的废液, 应: ()

- A. 随垃圾丢弃
- B. 向下水口倾倒
- C. 不得倒入同一收集桶中

(标准答案: C)

322、若某种废液倒入回收桶会发生危险, 则应: ()

- A. 直接向下水口倾倒
- B. 随垃圾一起丢弃
- C. 单独暂存于容器中, 并贴上标签

(标准答案: C)

323、易燃、易爆物品和杂物等应该堆放在: ()

- A. 烘箱、箱式电阻炉等附近
- B. 冰箱、冰柜等附近
- C. 单独通风的实验室内

(标准答案: C)

324、加热和蒸馏有易燃试剂的实验时, 不能用: ()

- A. 水浴锅
- B. 明火
- C. 通风橱

(标准答案: B)

325、实验室内的浓酸、浓碱处理, 一般可: ()

- A. 先中和后倾倒，并用大量的水冲洗管道
- B. 不经处理，沿下水道流走
- C. 不需中和，直接向下水道倾倒

(标准答案: A)

326、实验室内的汞蒸气会造成人员慢性中毒，为了减少汞液面的蒸发，可在汞液面上覆盖什么液体，效果最好? ()

- A. 水液体
- B. 甘油
- C. 5%Na₂SO₄

(标准答案: B)

327、在铣削中清理切屑时，应使用: ()

- A. 手
- B. 毛刷
- C. 棉丝
- D. 吹气

(标准答案: B)

328、以下哪项不属于死亡的特征? ()

- A. 呼之不应
- B. 呼吸停止
- C. 心跳停止
- D. 双侧瞳孔散大固定

(标准答案: A)

329、以下符合急救与防护“四先四后”原则的是: ()

- A. 先抢后救
- B. 先轻后重

- C. 先缓后急
- D. 先病后伤

(标准答案: A)

330、以下哪项不是呼吸、心跳停止的表现? ()

- A. 意识忽然丧失
- B. 颈动脉搏动不能触及
- C. 面色苍白转而紫绀
- D. 瞳孔缩小

(标准答案: D)

331、以下止血方法中,哪种不作为首选应用? ()

- A. 直接压迫止血法
- B. 止血点压迫止血法
- C. 填塞止血法
- D. 止血带止血法

(标准答案: D)

332、被电击的人能否获救,关键在于: ()

- A. 触电的方式
- B. 能否尽快脱离电源和施行紧急救护
- C. 触电电压的高低
- D. 人体电阻

(标准答案: B)

333、有人触电时,使触电人员脱离电源的错误方法是: ()

- A. 借助工具使触电者脱离电源
- B. 抓触电人的手
- C. 抓触电人的干燥外衣
- D. 切断电源

(标准答案: B)

334、发现燃气泄漏,正确做法是? ()

- A.触动电器开关或拨打电话
- B.使用明火
- C.迅速关阀门,打开门窗

(标准答案: C)

335、有异物刺入头部或胸部时,以下哪种急救方法是错误的? ()

- A.快速送往医院救治
- B.用毛巾等物将异物固定住,不让其乱动
- C.马上拔出,进行止血

(标准答案: C)

336、化学强腐蚀烫、烧伤事故发生后,应 , 保持创伤面的洁净以待医务人员治疗。或用适合于消除这类化学药品的特种溶剂、溶液仔细洗涤烫、烧伤面。()

- A. 迅速用大量清水冲洗干净皮肤
- B. 迅速解脱伤者被污染衣服, 及时用大量清水冲洗干净皮肤
- C. 迅速解脱伤者被污染衣服

(标准答案: B)

337、在实验中, 以下哪种做法是错误的? ()

- A. 一旦浓硫酸落在人体身上时, 用 4.5%乙酸或 1.5%左右的盐酸中和洗涤
- B. 一旦浓硫酸落在人体身上时, 以弱碱(2%碳酸钠)或肥皂液中和洗涤
- C. 一旦碱液落在皮肤上时, 用 4.5%乙酸或 1.5%左右的盐酸中和洗涤

(标准答案: A)

338、实验中溅入口中已下咽的强酸, 先饮用大量水, 再服用: ()

- A. 氢氧化铝溶液, 鸡蛋白
- B. 乙酸果汁, 鸡蛋白
- C. 硫酸铜溶液(30g 溶于一杯水中)催吐

(标准答案: A)

339、实验中溅入口中已下咽的强碱,先饮用大量水,再服用: ()

- A. 氢氧化铝膏,鸡蛋白
- B. 乙酸果汁,鸡蛋白
- C. 硫酸铜溶液(31g 溶于一杯水中)催吐

(标准答案: B)

340、实验室人员发生触电时,下列哪种行为是不正确的? ()

- A. 应迅速切断电源,将触电者上衣解开,取出口中异物,然后进行人工呼吸
- B. 应迅速注射兴奋剂
- C. 当患者伤势严重时,应立即送医院强救

(标准答案: B)

341、对实验室安全检查的重点是: ()

- A. 可燃易燃性、可传染性、放射性物质、有毒物质的使用和存放
- B. 清除污染和废弃物处置情况
- C. 规章制度的建立和执行情况
- D. 以上都是

(标准答案: D)

342、使用干燥箱和恒温箱,应注意的事项有: ()

- A. 使用前检查电源,要有良好的接地线
- B. 箱内应保持清洁,放物网篮不得有锈,否则影响待干燥物品的洁净度
- C. 塑料、有机玻璃制品的加热温度不能超过 60℃,玻璃制品的温度不能超过 180℃,使用温度不能超过干燥箱的最高允许温度,用毕要及时切断电源
- D. 以上都对

(标准答案: D)

343、诱发安全事故的原因是: ()

- A. 设备的不安全状态和人的不安全行为
- B. 不良的工作环境
- C. 劳动组织管理的缺陷
- D. 以上都是

(标准答案: D)

344、在实验内容设计过程中, 要尽量选择什么物品做实验? ()

- A. 无公害、无毒或低毒的物品
- B. 实验的残液、残渣较多的物品
- C. 实验的残液、残渣不可回收的物品

(标准答案: A)

345、实验室生物安全防护的内容包括: ()

- A. 安全设备、个体防护装置和措施
- B. 严格的管理制度和标准化的操作程序和规程
- C. 实验室的特殊设计和建设要求
- D. 以上都是

(标准答案: D)

346、使用离心机时下列哪种操作是错误的? ()

- A. 离心机必须盖紧盖子
- B. 不需要考虑离心管的对角平衡
- C. 液体不能超过离心管 2/3
- D. 每次使用后要清洁离心机腔

(标准答案: B)

347、对人类而言, 下列那种情况不属于生物威胁的来源: ()

- A. 各种致病微生物、转基因生物
- B. 外来生物入侵

- C. 工厂烟囱排放的空气污染
- D. 生物恐怖事件

(标准答案: C)

348、实验室生物安全等级分四级,哪级生物安全防护要求最高? ()

- A. 一级 (BSL-1)
- B. 二级 (BSL-2)
- C. 三级 (BSL-3)
- D. 四级 (BSL-4)

(标准答案: D)

349、实验室常用于皮肤或普通实验器械的消毒液有: ()

- A. 75%乙醇
- B. 福尔马林 (甲醛)
- C. 来苏儿 (甲酚)
- D. 漂白粉 (次氯酸钠)

(标准答案: A)

350、根据卫生部规定,人间传染的病原微生物按危害程度可分为四类,其中哪类危害程度最高? ()

- A. 第一类
- B. 第二类
- C. 第三类
- D. 第四类

(标准答案: A)

351、根据农业部规定,动物病原微生物按危害程度可分为四类,其中哪类危害程度最高? ()

- A. 第一类
- B. 第二类

- C. 第三类
- D. 第四类

(标准答案: A)

352、实验动物的生物安全性,指的是涉及动物的哪种实验? ()

- A. 化学实验
- B. 同位素实验
- C. 药物实验
- D. 病原微生物实验

(标准答案: D)

353、目前实验动物中,比较严重的人畜共患病是什么? ()

- A. 兔瘟病
- B. 犬瘟热
- C. 出血热病
- D. 猴 B 病毒病

(标准答案: C)

354、涉及生物安全性的动物实验,必须在哪一种实验室中进行? ()

- A. 净化式实验室
- B. 普通实验室
- C. BSL-1 以上生物安全实验室
- D. 正压实验室

(标准答案: C)

355、一般无特殊情况,每个人的晨脉是相对稳定的。如果运动锻炼后,第二天晨脉不变,说明身体状况良好或运动量合适;如果体育锻炼后,第二天的晨脉较以前增加多少次/分以上,说明前一天的活动量偏大,应适当调整运动量? ()

- A. 2 次
- B. 5 次

C. 8 次

D. 12 次

（标准答案：B）

356、运动中腹痛多数在中长跑时产生，主要是因为准备活动不充分，开始运动过于剧烈，或者跑的过快，内脏器官尚没有达到竞赛状态，致使什么功能失调，引起腹痛？（ ）

A. 脏腑

B. 呼吸

C. 血液循环

D. 精神紧张

（标准答案：A）

357、进行较剧烈的体育锻炼如球类比赛、快速跑、健美操等，运动后应多补充一些碱性食物，如：（ ）

A. 蔬菜、水果

B. 动物蛋白

C. 维生素

D. 糖

（标准答案：A）

358、在体育锻炼时或体育锻炼后即刻，立即测 10 秒钟的心率和脉搏，就一般体育锻炼者来说，运动后即刻的心率最好不要超过多少次/10 秒？（ ）

A. 20 次

B. 25 次

C. 30 次

D. 35 次

（标准答案：B）

359、干粉灭火器适用于：（ ）

- A. 电器起火
- B. 可燃气体起火
- C. 有机溶剂起火
- D. 以上都是

(标准答案: D)

360、爆炸物品在发生爆炸时的特点有: ()

- A. 反应速度极快, 通常在万分之一秒以内即可完成
- B. 释放出大量的热
- C. 产生大量的气体
- D. 以上都是

(标准答案: D)

361、被火困在室内,如何逃生? ()

- A. 跳楼
- B. 到窗口或阳台挥动物品求救、用床单或绳子拴在室内牢固处下到下一层逃生
- C. 躲到床下,等待救援
- D. 打开门,冲出去

(标准答案: B)

362、在火灾初发阶段,应采取哪种方法撤离? ()

- A. 乘坐电梯
- B. 用湿毛巾捂住口鼻低姿从安全通道撤离
- C. 跳楼逃生
- D. 跑到楼顶呼救

(标准答案: B)

363、火灾发生时,湿毛巾折叠 8 层为宜,其烟雾浓度消除率可达: ()

- A. 40%
- B. 60%

C. 80%

D. 95%

（标准答案：B）

364、火灾蔓延的途径是：（ ）

A. 热传导

B. 热对流

C. 热辐射

D. 以上都是

（标准答案：D）

365、扑救易燃液体火灾时，应用那种方法？（ ）

A. 用灭火器

B. 用水泼

C. 扑打

D. 以上都可以

（标准答案：A）

366、扑灭电器火灾不宜使用下列何种灭火器材？（ ）

A. 二氧化碳灭火器

B. 干粉灭火器

C. 泡沫灭火器

D. 灭火砂

（标准答案：C）

367、身上着火，最好的做法是：（ ）

A. 就地打滚或用水冲

B. 奔跑

C. 大声呼救

D. 边跑边脱衣服

(标准答案: A)

368、实验大楼安全出口的疏散门应: ()

- A. 自由开启
- B. 向外开启
- C. 向内开启
- D. 关闭, 需要时可自行开启

(标准答案: B)

369、使用灭火器扑救火灾时要对准火焰的什么部位喷射。()

- A. 上部
- B. 中部
- C. 根部
- D. 中上部

(标准答案: C)

370、下列哪项不是影响混合物爆炸极限的因素? ()

- A. 混合物的温度、压力
- B. 混合物的多少
- C. 混合物的含氧量
- D. 容器的大小

(标准答案: B)

371、下列选项中属于防爆的措施有: ()

- A. 防止形成爆炸性混合物的化学品泄漏
- B. 控制可燃物形成爆炸性混合物
- C. 消除火源、安装检测和报警装置
- D. 以上都是

(标准答案: D)

372、窒息灭火法是将氧气浓度降低至最低限度，以防止火势继续扩大。其主要工具是：（ ）

- A. 砂子
- B. 水
- C. 二氧化碳灭火器
- D. 干粉灭火器

（标准答案：C）

373、采取适当的措施，使燃烧因缺乏或隔绝氧气而熄灭，这种方法称作：（ ）

- A. 窒息灭火法
- B. 隔离灭火法
- C. 冷却灭火法

（标准答案：A）

374、身上着火后,下列哪种灭火方法是错误的？（ ）

- A. 就地打滚
- B. 用厚重衣物覆盖压灭火苗
- C. 迎风快跑
- D. 大量水冲或跳入水中

（标准答案：C）

375、实验室仪器设备用电或线路发生故障着火时，应立即 ，并组织人员用灭火器进行灭火。（ ）

- A. 将贵重仪器设备迅速转移
- B. 切断现场电源
- C. 将人员疏散

（标准答案：B）

376、如果实验出现火情，要立即：（ ）

- A. 停止加热，移开可燃物，切断电源，用灭火器灭火
- B. 打开实验室门，尽快疏散、撤离人员
- C. 用干毛巾覆盖上火源，使火焰熄灭

(标准答案: A)

377、实验大楼因出现火情发生浓烟已穿入实验室内时，以下哪种行为是正确的？

()

- A. 沿地面匍匐前进，当逃到门口时，不要站立开门
- B. 打开实验室门后不用随手关门
- C. 从楼上向楼下外逃时可以乘电梯

(标准答案: A)

378、使用灭火器扑救火灾时，要对准火焰哪个部位喷射？ ()

- A. 上部
- B. 中部
- C. 根部

(标准答案: C)

379、做加热易燃液体实验时，应 ()

- A. 用电炉加热，要有人看管
- B. 用电热套加热，可不用人看管
- C. 用水浴加热，要有人看管

(标准答案: C)

381、实验室安全管理应坚持以下哪个方针。 ()

- A. 安全第一，实验第二
- B. 安全第一，预防为主
- C. 安全为了实验，实验必须安全

(标准答案: B)

382、当不慎把少量浓硫酸滴在皮肤上时，正确的处理方法是：（ ）

- A. 用酒精擦
- B. 马上去医院
- C. 用碱液中和后，用水冲洗
- D. 以吸水性强的纸吸去后，用水冲洗

（标准答案：D）

383、被电击的人能否获救，关键在于：（ ）

- A. 触电的方式
- B. 人体电阻的大小
- C. 触电电压的高低
- D. 能否尽快脱离电源和施行紧急救护

（标准答案：D）

384、任何电气设备在未验明无电之前，一律认为是：（ ）

- A. 无电
- B. 也许有电
- C. 有电

（标准答案：C）

385、电线插座损坏时，将会引起：（ ）

- A. 工作不方便
- B. 不美观
- C. 触电伤害

（标准答案：C）

386、回流和加热时，液体量不能超过烧瓶容量的（ ）

- A. 1/2
- B. 2/3

C. 3/4

D. 4/5

(标准答案: B)

387、触电事故中,绝大部分导致人身伤亡的是()

A. 人体接受电流遭到电击

B. 电压

C. 电场

(标准答案: A)

388、为防止静电火花引起事故,凡是用来加工、贮存、运输各种易燃气、液、粉体的设备的金属管、非导电材料管都必须()

A. 有足够大的电阻

B. 有足够小的电阻

C. 可靠接地

(标准答案: C)

390、应增强信息安全的意识,注意保护教学科研活动中实验技术参数、观测数据、实验分析结果及新的科学发现等资料。()

(标准答案: 对)

391、在易燃易爆场所不能穿:()

A.布鞋

B.胶鞋

C.带钉鞋

(标准答案: C)

392、实验室电器设备所引起的火灾,应:()

- A. 用水灭火
- B. 用二氧化碳或干粉灭火器灭火
- C. 用泡沫灭火器灭火

(标准答案: B)

393、师生进入实验室工作,一定要搞清楚()等位置,有异常情况,要关闭相应的总开关。

- A. 日光灯开关、水槽、通风橱
- B. 电源总开关、水源总开关
- C. 通风设备开关、多媒体开关、计算机开关

(标准答案: B)

394、发生电气火灾后,首先应该采取的第一条措施是: ()

- A. 打电话报警
- B. 切断电源
- C. 扑灭明火
- D. 保护现场,分析火因,以便采取措施,杜绝隐患

(标准答案: B)

395、可以在化学实验室穿着的鞋是: ()

- A. 凉鞋
- B. 高跟鞋
- C. 拖鞋
- D. 球鞋

(标准答案: D)

396、在使用设备时,如果发现设备工作异常,怎么办? ()

- A. 停机并报告相关管理人员
- B. 关机走人

- C. 继续使用，注意观察
- D. 停机自行维修

（标准答案：A）

397、如果触电者伤势严重，呼吸停止或心脏停止跳动，应竭力施行以下哪个方法和胸外心脏挤压的救治措施。（ ）

- A. 按摩
- B. 点穴
- C. 人工呼吸

（标准答案：C）

398、节假日期间，仍然需要进入实验室工作的人员，要严格遵守实验室操作规程，做实验时必须要有人在场，并且在实验完成离开时负责（ ），锁好门窗，以防火灾和爆炸、溢水等事故。（ ）

- A. 关闭仪器设备
- B. 关闭水源、电源、气源
- C. 关闭计算机

（标准答案：B）

399、由于行为人的过失引起火灾，造成严重后果的行为，构成（ ）

- A. 纵火罪
- B. 失火罪
- C. 重大责任事故罪

（标准答案：B）

消防安全习题

1、进入实验室前无须熟记实验室安全第一责任人电话。（ ）

（标准答案：错）

2、开始实验前应认真学习实验室安全应急处置流程。（ ）

（标准答案：对）

3、实验室发生安全事故应第一时间通知实验室安全责任人。（ ）

（标准答案：对）

4、实验室门口无须挂上写有安全责任人姓名和联系方式的牌子。（ ）

（标准答案：错）

5、实验室内发生简单事故（事态比较简单，在较小范围内对研究所的安全稳定造成危害或威胁，凭借研究所的应急救援力量和资源就可以处置的），应第一时间联系谁？（ ）

A. 110

B. 部门主任

C. 综合办公室负责人

D. 实验室负责人

（标准答案：D）

6、实验室应急报告内容：（ ）

A. 事故发生的时间、地点、起因、影响；

B. 事故抢救处理的情况和采取的措施；

C. 需要有关部门和单位协助抢救和处理的有关事宜，并根据事态发展和处置情况及时续报；

D. 以上都是。

（标准答案：D）

7、危险化学品泄漏事故处置包括：（ ）

A. 围堤堵截

B. 稀释与覆盖

C. 收集和废弃处理

D. 以上都是

（标准答案：D）

8、烧伤发生时，立即用冷水冲洗，或浸入附近水池浸泡，防止烧伤面积进一步扩大。（ ）

（标准答案：对）

9、实验室发生爆炸时，事故现场人员在确保自身安全情况下，迅速切断电源和管道阀门，转移其他易爆物品，并立即报告。（ ）

（标准答案：对）

二、消防及应急安全习题

1、火灾发生后，当所有的逃生线路被大火封锁时，应立即退回室内，用手电筒、挥舞衣物、呼叫等方式向窗外发送求救信号，等待救援。（ ）

（标准答案：对）

2、当电气设备发生火灾后，如果可能应当先断电后灭火。（ ）

（标准答案：对）

3、当发生火情时尽快沿着疏散指示标志和安全出口方向迅速离开火场。（ ）

（标准答案：对）

4、消防工作的方针是：“预防为主，防消结合”，实行消防安全责任制。（ ）

（标准答案：对）

5、大火封门无路可逃时，可用浸湿的被褥、衣物堵塞门缝，向门上泼水降温，以延缓火灾蔓延时间，呼叫待援。（ ）

（标准答案：对）

6、在着火和救火时，若衣服着火，要赶紧跑到空旷处用灭火器扑灭。（ ）

（标准答案：错）

7、在熟睡时，听到火警信号后正确的做法是：1、用手试一试门是否热，如是冷的，可开门逃生；2、准备好湿毛巾；3、切勿随意跳楼，自制救生绳索后再设法安全着落；4、利用自然条件作为救生滑道。（ ）

（标准答案：对）

8、扑救气体火灾切忌盲目扑灭火势，首先应切断火势蔓延途径，然后疏散火势中压力容器或受到火焰辐射热威胁的压力 容器，不能疏散的部署水枪进行冷却保护。（ ）

（标准答案：对）

9、灭火器材设置点附近不能堆放物品,以免影响灭火器的取用。（ ）

（标准答案：对）

10、用灭火器灭火时,灭火器的喷射口应该对准火焰的中部。（ ）

（标准答案：错）

11、发现火灾时，单位或个人应该先自救，当自救无效、火越着越大时，再拨打火警电话 119。（ ）

（标准答案：错）

12、在扑灭电气火灾的明火时，用气体灭火器扑灭。（ ）

（标准答案：对）

14、实验大楼因出现火情发生浓烟时应迅速离开，当浓烟已穿入实验室内时，要沿地面匍匐前进，因地面层新鲜空气较多，不易中毒而窒息，有利于逃生。当逃到门口时，千万不要站立开门，以避免被大量浓烟熏倒。（ ）

（标准答案：对）

15、有“严禁烟火”警示牌的大楼和实验室，可不必配 置必要的消防、冲淋、洗眼、报警和逃生设施和有明显标志。（ ）

（标准答案：错）

16、使用手提灭火器时，拔掉保险销，握住胶管前端， 对准燃烧物根部用力压下压把，灭火剂喷出，左右扫射，就可灭火。（ ）

（标准答案：对）

17、实验大楼出现火情时千万不要乘电梯，因为电梯可能因停电或失控，同时又因“烟囱效应”，电梯井常常成为浓烟的 流通道。（ ）

（标准答案：对）

18、若宿舍门外已被大火封死，要紧闭房门，用湿毛巾 等堵塞门缝，在室内等待救援。（ ）

（标准答案：对）

19、火灾发生后，穿过浓烟逃生时，必须尽量贴近地面，并用湿毛巾捂住口鼻。（ ）

（标准答案：对）

20、万一发生了火灾，不管是否是电气方面引起的，首先要想办法迅速切断火灾范围内的电源。（ ）

（标准答案：对）

21、火灾发生后，受到火势威胁时，要当机立断披上浸湿的衣物、被褥等向安全出口方向冲去。（ ）

（标准答案：对）

22、实验室发生非火灾类事故，应立即报告单位负责人和综合办公室负责人，设立警戒区并撤离无关人员，以减轻潜在危害。（ ）

（标准答案：对）

23、电气设备着火，首先必须采取的措施是灭火。（ ）

（标准答案：错）

24、实验室必须配备符合本室要求的消防器材，消防器材要放置在明显或便于拿取的位置。严禁任何人以任何借口把消防 器材移作它用。（ ）

（标准答案：对）

25、身上着火被熄灭后,应马上把粘在皮肤上的衣物脱下来。（ ）

（标准答案：错）

26、岗位消防安全“四知四会”中的“四会”是指：会报警，会使用消防器材，会扑救初期火灾，会逃生自救（ ）

（标准答案：对）

27、液体着火时，应用灭火器灭火，不能用水扑救或其它物品扑打。（ ）

(标准答案: 对)

28、不得堵塞实验室逃生通道。()

(标准答案: 对)

29、灭火器按其移动形式可分为: 手提式和推车式。()

(标准答案: 对)

30、火灾对实验室构成的威胁最为严重, 最为直接。应加强对火灾三要素(易燃物、助燃物、点火源)的控制。()

(标准答案: 对)

31、实验室灭火的方法要针对起因选用合适的方法。一般小火可用湿布、石棉布或沙子覆盖燃烧物即可灭火。()

(标准答案: 对)

32、所有的火灾刚开始时都是小火, 随着火灾的发展输出的热量越大, 火灾蔓延的速度和范围也愈大, 所以扑灭初起火灾 最容易的。()

(标准答案: 对)

36、火场逃生的原则是()。

- A、抢救国家财产为上
- B、先带上日后生活必需钱财要紧
- C、安全撤离、救助结合
- D、逃命要紧

(标准答案: C)

37、身上着火后,下列哪种灭火方法是错误的?()

- A、就地打滚
- B、用厚重衣物覆盖压灭火苗
- C、迎风快跑
- D、大量水冲或跳入水中

(标准答案: C)

38、火灾中对人员威胁最大的是（ ）

- A、火
- B、烟火
- C、可燃物

（标准答案：B）

40、扑救电气设备火灾时，不能用什么灭火器？（ ）

- A、四氯化碳灭火器
- B、二氧化碳灭火器
- C、泡沫灭火器

（标准答案：C）

41、公安消防人员在灭火过程中，应当（ ）

- A.优先救人
- B.优先抢救财物
- C.优先灭火

（标准答案：A）

42、实验室仪器设备用电或线路发生故障着火时，应立即（ ），并组织人员用灭火器进行灭火。（ ）

- A、将贵重仪器设备迅速转移
- B、切断现场电源
- C、将人员疏散

（标准答案：B）

43、使用灭火器扑救火灾时要对准火焰的什么部位喷射。（ ）

- A、上部
- B、中部
- C、根部
- D、中上部

(标准答案: C)

44、公共场所安全出口的疏散门应 ()。()

- A、双向开启
- B、向外开启
- C、向内开启

(标准答案: B)

45、泡沫灭火器不能用于扑救 () 火灾。()

- A、塑料
- B、汽油
- C、金属钠

(标准答案: C)

46、科研楼应配备的灭火器型号是: ()

- A、ABC 干粉灭火器
- B、干粉灭火器
- C、泡沫灭火器

(标准答案: A)

48、当遇到火灾时,要迅速向 () 逃生。()

- A、着火相反的方向
- B、人员多的方向
- C、安全出口的方向

(标准答案: C)

49、储存可燃物资仓库的管理,必须执行国家有关 ()

- A.消防安全
- B.物资安全
- C.劳动安全

(标准答案: A)

50、灭火器上的压力表用红、黄、绿三色表示灭火器的压力情况，当指针指在绿色区域表示：（ ）

- A、正常
- B、偏高
- C、偏低

（标准答案：A）

51、实验室电器发生火灾，在没有灭火器的情况下应先：（ ）

- A、用水扑救
- B、用毛毯包裹
- C、切断电源
- D、用沙盘灭火

（标准答案：C）

52、从下列选项中选择万一发生电气火灾后首先应该采取的第一条措施（ ）

- A、打电话报警
- B、切断电源
- C、扑灭明火
- D、保护现场，分析火因，以便采取措施，杜绝隐患

（标准答案：B）

53、有机物或能与水发生剧烈化学反应的药品着火，应用（ ），以免扑救不当造成更大损害。（ ）

- A、其他有机物灭火
- B、自来水灭火
- C、灭火器或沙子扑灭

（标准答案：C）

57、干粉灭火器适用于：（ ）

- A、电器起火
- B、可燃气体起火
- C、有机溶剂起火
- D、以上都是

（标准答案：D）

58、发生火灾时，正确的安全疏散主要有三个方向，向下可以跑到地面，向上可以爬到屋顶，还可以：（ ）

- A.躲到角落里
- B.向外逃到阳台
- C.钻到阁楼、大橱等处避难

（标准答案：B）

59、窒息灭火法是将氧气浓度降低至最低限度，以防止火势继续扩大。其主要工具是：（ ）

- A、砂子
- B、水
- C、二氧化碳灭火器
- D、干粉灭火器

（标准答案：C）

60、在火灾初发阶段，应采取哪种方法撤离？（ ）

- A、乘坐电梯
- B、用湿毛巾捂住口鼻低姿从安全通道撤离
- C、跳楼逃生
- D、跑到楼顶呼救

（标准答案：B）

61、灭火的四种方法是：（ ）

- A、捂盖法、扑打法、浇水法、隔离法
- B、扑灭法、救火法、化学法、泡沫法
- C、隔离法、窒息法、冷却法、化学抑制法

(标准答案: C)

62、可以用水扑灭的火灾是下列哪种物质? ()

- A、油类起火
- B、酒精起火
- C、电器起火
- D、棉被起火

(标准答案: D)

66、被火困在室内,如何逃生? ()

- A、跳楼
- B、到窗口或阳台挥动物品求救、用床单或绳子拴在室内牢固处下到 下一层逃生
- C、躲到床下,等待救援
- D、打开门,冲出去

(标准答案: B)

67、实验大楼因出现火情发生浓烟已穿入实验室内时,以下哪种行为是正确的?

()

- A、沿地面匍匐前进,当逃到门口时,不要站立开门
- B、打开实验室门后不用随手关门
- C、从楼上向楼下外逃时可以乘电梯

(标准答案: A)

68、楼内失火应: ()

- A、从疏散通道逃离
- B、乘坐电梯逃离

- C、在现场等待救援
- D、见到门口就跑

(标准答案: A)

70、在室外灭火时,应站在什么位置? ()

- A、上风
- B、下风
- C、随便哪里

(标准答案: A)

71、火灾蔓延的途径是: ()

- A、热传导
- B、热对流
- C、热辐射
- D、以上都是

(标准答案: D)

72、火灾初起阶段是扑救火灾()的阶段。 ()

- A、最不利
- B、最有利
- C、较不利

(标准答案: B)

73、在火灾逃生方法中,以下不正确的是: ()

- A.用湿毛巾捂着嘴巴和鼻子
- B.弯着身子快速跑到安全地点
- C.躲在床底下,等待消防人员救援?
- D.马上从最近的消防通道跑到安全地点。

(标准答案: C)

74、窒息灭火法是将氧气浓度降低至最低限度，以防止火势继续扩大。其使用的灭火器是_____（ ）

- A. 砂子
- B. 水
- C. 二氧化碳灭火器
- D. 干粉灭火器

（标准答案：C）

75、遭遇火险脱险方法正确的是_____（ ）

- A. 用湿毛巾掩住口鼻，从安全通道匍匐前进
- B. 披上浸湿的衣物，向安全出口方向逃生
- C. 用床单、衣服等自制简易救生绳从楼上小心滑下
- D. 以上都对

（标准答案：D）

77、火灾蔓延的途径是：（ ）

- A. 热传导
- B. 热对流
- C. 热辐射
- D. 以上都是

（标准答案：D）

三、化学安全习题

1、气体钢瓶使用后，可以不关闭阀门。（ ）

（标准答案：错）

2、冷凝冷却系统上连接用的橡胶管必须用铁丝等固定住，以防止因水压过高而造成管子脱落。（ ）

（标准答案：对）

3、可以用烘箱干燥有爆炸危险性的物质。（ ）

（标准答案：错）

4、金属锂、钠、钾及金属氢化物要注意使用和保存，尤其不能与水直接接触。

（ ）

（标准答案：对）

5、能相互反应产生有毒气体的废液，不得倒入同一收集桶中。若某种废液倒入收集桶会发生危险，则应单独暂存于容器中，并贴上标签。（ ）

（标准答案：对）

7、对于化学试剂或未知物,允许直接用鼻子嗅气味，不用以手扇出少量气体来嗅觉。（ ）

（标准答案：错）

8、在实验室内一切有可能产生毒性蒸气的工作必须在通风橱中进行，并有良好的排风设备。（ ）

（标准答案：对）

9、在稀释浓硫酸时，不能将水往浓硫酸里倒，而应将浓硫酸缓缓倒入水中，不断搅拌均匀。（ ）

（标准答案：对）

10、实验室内的浓酸、浓碱处理，一般要先中和后倾倒，并用大量的水冲洗管道。（ ）

（标准答案：对）

11、对于无机酸类废液，实验室可以收集后进行如下处理：将废酸慢慢倒入过量的含碳酸钠或氢氧化钙的水溶液中（或用废碱）互相中和，再用大量水冲洗。

（ ）

（标准答案：对）

12、对于氢氧化钠、氨水等废液可以进行如下处理：用 6mol/L 盐酸水溶液中
和，再用大量水冲洗。（ ）

（标准答案：对）

13、对于含汞、砷、锑、铋等离子的废液，实验室可以先进行如下处理：控制
酸度 0.3mol/L[H⁺]，使其生成硫化物沉淀。（ ）

（标准答案：对）

15、对于含氟废液可以进行如下处理：加入石灰使生成氟化钙沉淀。（ ）

（标准答案：对）

16、可以将氯气与氨气混放在一个房间。（ ）

（标准答案：错）

17、可以将氢气与氧气混放在一个房间。（ ）

（标准答案：错）

18、可以将乙炔与氧气混放在一个房间。（ ）

（标准答案：错）

19、加热试管内物质时，管口应朝向自己，以便看清楚反应过程。（ ）

（标准答案：错）

20、对含有悬浮物质的溶液加热时，应加沸石或玻璃珠，以避免爆沸现象产生。
（ ）

（标准答案：对）

21、因为乙醚长时间与空气接触可以形成羟乙基过氧化氢，成为一种具有猛烈
爆炸性的物质，因此，在蒸馏乙醚时不能将液体蒸干。（ ）

（标准答案：对）

22、在进行萃取或洗涤操作时，为了防止物质高度浓缩而导致内部压力过大，
产生爆炸，应该注意及时排出产生的气体。（ ）

(标准答案: 对)

23、实验后剩余的金属钠,应用大量的水冲洗。()

(标准答案: 错)

24、在实验室进行有机合成时,放热反应不能在密闭的玻璃容器中进行;对反应物进行加热时,也不能将玻璃容器密闭。()

(标准答案: 对)

25、酒精灯内的酒精量最多可加九分满。()

(标准答案: 错)

26、酒精灯不再使用时,应立刻用嘴吹气灭火。()

(标准答案: 错)

27、给液体加热时,可以先开始加热,等接近沸腾时再加入沸石。()

(标准答案: 错)

28、取用强碱性试剂后的小勺应擦净后存放。()

(标准答案: 错)

29、实验室进行蒸馏操作时,对于爆炸性物质或不稳定物质,须小心地蒸馏直到剩余少量残渣。()

(标准答案: 错)

30、危险物质用惰性溶剂稀释后比较安全,该溶液若洒到布上,待溶剂蒸发变干后可以再使用。()

(标准答案: 错)

31、打开易挥发或浓酸、浓碱试剂的瓶塞时,瓶口不要对着脸部或其他人,宜在通风橱中进行。()

(标准答案: 对)

32、取用有毒、有恶臭味的试剂时,要在通风橱中操作;使用完毕后,将瓶塞蜡封,或用生料带将瓶口封严。()

(标准答案: 对)

33、干燥箱和恒温箱的使用温度不能超过最高允许温度。（ ）

（标准答案：对）

34、储存在冰箱内的所有容器，应当清楚地标明内装物品的品名、储存日期和储存者的姓名。（ ）

（标准答案：对）

35、为安全起见，平时应将低沸点溶剂保存于普通冰箱内以降低溶剂蒸汽压。

（ ）

（标准答案：错）

36、通常有害药品经呼吸器官、消化器官或皮肤吸入体内，引起中毒。因此，我们切忌口尝、鼻嗅及用手触摸药品。（ ）

（标准答案：对）

37、使用强氧化剂时环境温度不宜过高，通风应良好，并不要与有机物或还原性物质共同使用。（ ）

（标准答案：对）

38、装有易燃液体的器皿可置于日光下。（ ）

（标准答案：错）

39、实验中的过量化学品应当返回其原来的试剂瓶中以免浪费。（ ）

（标准答案：错）

40、当发生强碱溅洒事故时，应用固体硼酸粉撒盖溅洒区，扫净并报告有关工作人员。（ ）

（标准答案：对）

41、处理有毒的气体、能产生蒸气的药品及有毒的有机溶剂，必须在通风厨内进行。（ ）

（标准答案：对）

42、打开氨水、硝酸、盐酸等药品瓶封口时，应先盖上湿布，用冷水冷却后再开瓶塞，以防溅出，尤其在夏天更应注意。（ ）

（标准答案：对）

43、实验过程中应尽量避免实验仪器在夜间无人看管的情况下连续运转，如果必须在夜间使用，应严格检查实验仪器的漏电保护装置及空气开关等工作正常。

（ ）

（标准答案：对）

45、对沾染过有毒物质的仪器和用具，实验完毕应立即采取适当方法处理以破坏或消除其毒性。（ ）

（标准答案：对）

46、实验过程中长时间使用恒温水浴锅时，应注意及时加水，避免干烧发生危险。（ ）

（标准答案：对）

47、箱式电阻炉的使用必须经过实验室管理员的同意，确保安全用电。（ ）

（标准答案：对）

48、烧杯、烧瓶及试管等加热时比较安全。（ ）

（标准答案：错）

49、吸滤瓶及一些厚壁玻璃容器，清洗后可直接放入温度较高的烘箱进行干燥。

（ ）

（标准答案：错）

50、转速较低的离心机可以在工作时打开机盖观察。（ ）

（标准答案：错）

51、用活泼金属做除水实验，已观察不到金属的氧化反应，就可以将活泼金属丢弃。（ ）

（标准答案：错）

52、水银温度计破了以后正确的处理是：洒落出来的汞必须立即用滴管、毛刷收集起来，并用水覆盖（最好用甘油），然后在污染处撒上硫磺粉，无液体后（一般约一周时间）方可清扫。（ ）

（标准答案：对）

53、使用离心机时，当部分装载时，离心管可随意放在转头中而不用考虑平衡。（ ）

（标准答案：错）

54、腐蚀和刺激性药品，如强酸、强碱、氨水、过氧化氢、冰醋酸等，取用时尽可能戴上橡皮手套和防护眼镜，倾倒时，切勿直对容器口俯视，吸取时，应该使用橡皮球。开启有毒气体容器时应戴防毒用具。禁止手直接拿取上述物品。（ ）

（标准答案：对）

55、对产生有毒气体的实验应在通风橱内进行。通过排风设备将毒气排到室外，以免污染室内空气。（ ）

（标准答案：错）

56、开启氨水、浓盐酸瓶应该在通风橱中进行。（ ）

（标准答案：对）

57、当水银仪器破损时，应尽量将洒落的水银收集起来，并在残迹处洒上硫磺粉。（ ）

（标准答案：对）

58、可以在木质或塑料等实验台上直接使用加热电炉。（ ）

（标准答案：错）

59、打开封闭管或紧密塞着的容器时，注意其内部是否有压力，容器口不得对人，避免发生喷液或爆炸事故。（ ）

（标准答案：对）

60、玻璃器具在使用前要仔细检查，避免使用有裂痕的仪器。特别用于减压、加压或加热操作的场合，更要认真进行检查。（ ）

(标准答案: 对)

61、对固态酸、碱可用手直接操作。()

(标准答案: 错)

62、不应用双手同时触及电器,防止触电时电流通过心脏。()

(标准答案: 对)

63、做减压蒸馏时,如果没有梨形接收瓶,可用锥形瓶代替。()

(标准答案: 错)

64、电线接头裸露部分可用医用胶布等包裹绝缘。()

(标准答案: 错)

65、电加热设备必须有专人负责使用和监督,离开时要切断电源。()

(标准答案: 对)

66、用低沸点溶剂洗涤过的滤饼,可直接放入烘箱干燥。()

(标准答案: 错)

67、可以在纸上称量过氧化钠。()

(标准答案: 错)

68、当某些用石蜡封住瓶塞的装有挥发性物质或易受热分解放出气体的药品瓶子打不开时,可将瓶子放在火上烘烤。()

(标准答案: 错)

69、加热、回流易燃液体,为防止暴沸、喷溅,蒸馏中途不能添加沸石。()

(标准答案: 对)

70、危险化学品用完后就可以将安全标签撕下。()

(标准答案: 错)

71、在装置汞的仪器下面应放一搪瓷盘,以免不慎将汞洒在地上。()

(标准答案: 对)

72、溴(水)是腐蚀性极强的物质,必须在通风柜中操作,并注意安全。()

(标准答案: 对)

73、实验室可以存放大桶有机试剂。（ ）

（标准答案：错）

74、不得使用过期、未经检验和不合格的气体钢瓶。（ ）

（标准答案：对）

75、冷凝冷却系统上连接用的橡胶管必须定期检查更换,避免管子老化而引起漏水事故的发生。（ ）

（标准答案：对）

76、可以穿拖鞋或凉鞋进入化学实验室。（ ）

（标准答案：错）

77、盛装废弃危险化学品的容器和受废弃危险化学品污染的包装物，必须按照危险废物进行管理。（ ）

（标准答案：对）

78、产生有害废气的实验室必须按规定安装通风、排风设施，必要时须安装废气吸收系统，保持通风和空气新鲜。（ ）

（标准答案：对）

79、易燃、易爆气体和助燃气体（氧气等）可以混放在一起，并靠近热源和火源。（ ）

（标准答案：错）

80、走廊比较通风时，可存放危险化学品。（ ）

（标准答案：错）

81、对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志。（ ）

（标准答案：对）

82、收集、贮存危险废物，必须按照危险废物特性分类进行。禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相容而未经安全性处置的危险废物。（ ）

（标准答案：对）

83、公安部门负责危险化学品的公共安全管理，负责发放剧毒化学品购买凭证和准购证，负责审查核发剧毒化学品公路运输通行证，对危险化学品道路运输安全实施监督，并负责前述事项的监督检查。（ ）

（标准答案：对）

84、使用危险化学品单位应当制定本单位事故应急救援预案，配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备，并定期组织演练。（ ）

（标准答案：对）

85、领取剧毒物品时，需双人领用(其中一人必须是实验室的教师)。（ ）

（标准答案：对）

86、各实验室对所产生的化学废弃物必须要实行集中分类存放，贴好标签，然后送化学废弃物仓库，统一处置。（ ）

（标准答案：对）

87、各实验室在运送化学废弃物到化学废弃物仓库之前，不得堆放在走廊、过道以及其它公共区域。（ ）

（标准答案：对）

88、严格执行剧毒品“五双”管理制度，即使实验在进行中，也必须在取出实验使用量后立即存入保险柜，做好记录，严防疏漏。（ ）

（标准答案：对）

89、使用和储存易燃、易爆物品的实验室应根据实际情况安装通风装置，严禁吸烟和使用明火，大楼和实验室应有“严禁烟火”的警示牌，配置必要的消防、冲淋、洗眼、报警和逃生设施。（ ）

（标准答案：对）

90、不能将乙醚等易挥发品放入普通冰箱，否则由于挥发气体不断溢出，而普通冰箱启动时有电火花出现，就有可能引起火灾。（ ）

（标准答案：对）

91、对高压气体钢瓶要分类保管，直立固定。严禁将氯气与氨气，氢气与氧气，乙炔与氧气混放在一个房间。（ ）

（标准答案：对）

92、实验室内的浓酸、浓碱如果不经处理，沿下水道流走，对管道会产生很强的腐蚀，又造成环境的污染。（ ）

（标准答案：对）

93、剧毒品在取出实验使用量后可以不立即存入保险柜。（ ）

（标准答案：错）

94、危险废物可以混入非危险废物中贮存或混入生活垃圾中贮存。（ ）

（标准答案：错）

95、实验中产生的废液、废物应分类集中处理，不得任意排放；对未知废料不得任意混合。酸、碱或有毒物品溅落时，应及时清理及除毒。（ ）

（标准答案：对）

96、酸、碱、盐水溶液使用后，经自来水稀释后可直接排入下水道。（ ）

（标准答案：错）

97、有机废物、浓酸或浓碱废液等倒入水槽，只要加大量的自来水将之冲稀即可。（ ）

（标准答案：错）

98、化学危险物品应当分类、分项存放，还原性试剂与氧化剂、酸与碱类腐蚀剂等不得混放，相互之间保持安全距离。（ ）

（标准答案：对）

99、遇火、遇潮容易燃烧、爆炸或产生有毒气体的化学危险品，不得在露天、潮湿、漏雨或低洼容易积水的地点存放。（ ）

（标准答案：对）

100、受阳光照射易燃烧、易爆炸或产生有毒气体的化学危险品和桶装、罐装等易燃液体、气体应当在阴凉通风的地点存放。（ ）

(标准答案：对)

101、凡涉及有害或有刺激性气体的实验应在通风柜内进行。()

(标准答案：对)

102、实验室的废液可以放入同一个废液桶中进行处理。()

(标准答案：错)

103、实验产生的废液(废酸、废碱等)和废弃固体物质可直接倒入下水道或普通垃圾桶。()

(标准答案：错)

104、实验产生或剩余的易挥发物，可以倒入废液缸内。()

(标准答案：错)

105、回收不便时可以将实验室废弃物掩埋处理。()

(标准答案：错)

106、对有异味或挥发性的废液或废物要丢弃在远离人群的地方。()

(标准答案：错)

107、存有易燃易爆物品的实验室禁止使用明火，如需加热可使用封闭式电炉、加热套或可加热磁力搅拌器。()

(标准答案：对)

108、冰箱内禁止存放危险化学物品，如果确需存放，则必须注意容器绝对密封，严防泄漏。()

(标准答案：对)

109、易燃、易爆物品要放在远离实验室的阴凉通风处，在实验室内保存的少量易燃易爆试剂要严格管理。()

(标准答案：对)

110、易燃、易挥发的溶剂不得在敞口容器中加热，应选用水浴加热器，不得用明火直接加热。()

(标准答案：对)

111、可以用普通的冰箱储藏易燃易爆的试剂。（ ）

（标准答案：错）

112、可以使用明火（如：电炉、煤气）或没有控温装置的加热设备直接加热有机溶剂，进行重结晶或溶液浓缩操作。（ ）

（标准答案：错）

113、过期的、不知名的固体化学药品可自行处理。（ ）

（标准答案：错）

114、乙醚、酒精、丙酮、二硫化碳、苯等有机溶剂易燃，实验室不得存放过多，切不可倒入下水道，以免集聚引起火灾。（ ）

（标准答案：对）

115、化学废液要用适当的容器盛装存放、定点保存，不需要分类收集。（ ）

（标准答案：错）

116、按国家有关规定处理有毒、腐蚀性的废气、废水和废物，集中统一处理，谨防污染环境。（ ）

（标准答案：对）

117、各种气瓶的存放，必须远离明火、避免阳光直晒，搬运时不得碰撞。（ ）

（标准答案：对）

118、生产、储存和使用危险化学品的单位，应当在生产、储存和使用场所设置报警装置。（ ）

（标准答案：对）

119、发生剧毒化学品被盗、丢失、误售、误用后必须立即向当地公安部门报告而触犯刑律的，否则对负有责任的主管人员和其他直接责任人员依照刑法追究刑事责任。（ ）

（标准答案：对）

120、实验室走廊不能放木制桌子、柜子等易燃物品，但可以放金属柜、冰箱等。

（ ）

(标准答案: 错)

121、实验室内严禁吸烟、饮食, 或把食具带进实验室。实验完毕, 必须洗净双手。()

(标准答案: 对)

122、禁止穿拖鞋、背心、短裤(裙)进入实验室, 高跟鞋可以进实验室。()

(标准答案: 错)

123、可以单独使用剧毒物品。()

(标准答案: 错)

124、学生在使用剧毒物品时, 必须由教师或实验室工作人员在场指导。()

(标准答案: 对)

125、对剧毒品采取必要的保安措施, 防止剧毒化学品被盗、丢失或者误售、误用; 发现剧毒化学品被盗、丢失或者误售、误用时, 必须立即向当地公安部门报告。()

(标准答案: 对)

126、实验室内的汞蒸气会造成人员慢性重毒, 为了减少汞液面的蒸发, 可在汞液面上覆盖化学液体(甘油)。()

(标准答案: 对)

127、对于实验室内溅落的汞物体, 应尽量捡拾起来放好, 然后洒上硫磺、多硫化钙等使汞生成不挥发的难溶盐。()

(标准答案: 对)

128、强酸溅入眼内时, 应立即用大量清水或生理盐水进行彻底冲洗, 冲洗时必须将上下眼睑拉开, 水不要流经未伤的眼睛, 不可直接冲击眼球。()

(标准答案: 对)

129、眼部碱灼伤时, 应立即用大量清水或生理盐水进行彻底冲洗, 冲洗时必须将上下眼睑拉开, 水不要流经未伤的眼睛, 不可直接冲击眼球, 然后可用 2%~3%硼酸溶液进一步冲洗。()

(标准答案: 对)

131、酚灼伤皮肤时,应立即脱掉被污染衣物,用 10%酒精反复擦拭,再用大量清水冲洗,直至无酚味为止,然后用饱和硫酸钠湿敷。()

(标准答案: 对)

133、氢氟酸灼伤皮肤后,先立即脱光去污染的衣物,用大量流动清水彻底冲洗后,继用肥皂水或 2%~5%碳酸氢钠冲洗,再用葡萄糖酸钙软膏涂敷按摩,然后再涂以 33%氧化镁甘油糊剂、维生素 AD 或可的松软膏等。()

(标准答案: 对)

134、误服强酸导致消化道烧灼痛,为防止进一步加重损伤,不能催吐,可口服牛奶、鸡蛋清、植物油等。()

(标准答案: 对)

135、发生强碱烧伤,应立即去除残留强碱,再以流动清水冲洗;若消化道被烧伤可适当服用一些牛奶、蛋清。()

(标准答案: 对)

136、凡进行有危险性的实验,应先检查防护措施,确证防护妥当后,才可进行实验。()

(标准答案: 对)

137、实验中,进行高温操作时,必须佩戴防高温手套。()

(标准答案: 对)

138、当有人呼吸系统中毒时,应迅速使中毒者离开现场,移到通风良好的环境,令中毒者呼吸新鲜空气,情况严重者应及时送医院治疗。()

(标准答案: 对)

139、眼睛溅入化学试剂时,应以大量清水冲洗,然后送医院诊治。()

(标准答案: 对)

140、一氧化碳泄漏，应先施行通风，以驱散一氧化碳气体，并切断一氧化碳泄漏源。（ ）

（标准答案：对）

141、有机溶剂只会经口鼻进入人体，只要正确的使用呼吸防护面具，就可以有效防止危害健康。（ ）

（标准答案：错）

142、通风控制措施就是借助于有效的通风，使气体、蒸气或粉尘的浓度低于最高容许浓度。（ ）

（标准答案：对）

143、由于金属络合剂能与毒物中的金属离子形成稳定的化合物，随尿液排出体外，故发生金属及其盐类中毒时，可采用各种金属络合剂解毒。（ ）

（标准答案：对）

144、CO 急性中毒应立即吸氧，以缓解机体缺氧、排出毒物。（ ）

（标准答案：对）

145、做危险化学实验时应配带各种眼镜进行防护，包括戴隐形眼镜。（ ）

（标准答案：错）

146、急性中毒发生时，救护人员在抢救前要做好自身呼吸系统和皮肤的防护，以免自身中毒、使事故扩大。（ ）

（标准答案：对）

147、中毒事故中救护人员进入现场，应先抢救中毒者，再采取措施切断毒物来源。（ ）

（标准答案：错）

148、碱灼伤后应立即用大量水洗，再以 1%-2%硼酸液洗，最后用水洗。（ ）

（标准答案：对）

149、发生危险化学品事故后，应该向上风方向疏散。（ ）

（标准答案：对）

150、含碱性洗涤剂的水可以清洗掉水果蔬菜表面的农药。（ ）

（标准答案：对）

151、有机溶剂能穿过皮肤进入人体，应避免直接与皮肤接触。（ ）

（标准答案：对）

152、溴灼伤皮肤，立即用乙醇洗涤，然后用水冲净，涂上甘油或烫伤油膏。（ ）

（标准答案：对）

153、电路或电器着火时，使用二氧化碳灭火器灭火。（ ）

（标准答案：对）

154、在着火和救火时，若衣服着火，要赶紧跑到空旷处用灭火器扑灭。（ ）

（标准答案：错）

155、电路或电器着火时，可用泡沫灭火器灭火。（ ）

（标准答案：错）

156、当酸或碱溅入眼睛时，不必采取应急处理，只要立即送附近医院救治。（ ）

（标准答案：错）

157、干粉灭火剂是扑救精密仪器火灾的最佳选择。（ ）

（标准答案：错）

158、用灭火器灭火时，灭火器的喷射口应该对准火焰的中部。（ ）

（标准答案：错）

159、实验室发现可燃气体泄漏，要迅速切断电源，打开门窗。（ ）

（标准答案：错）

160、发现火灾时，单位或个人应该先自救，当自救无效、火越着越大时，再拨打火警电话 119。（ ）

（标准答案：错）

161、当被烧伤时，正确的急救方法应该是以最快的速度用冷水冲洗烧伤部位。

（ ）

（标准答案：对）

162、皮肤烧伤后如有水泡,应及时将水泡刺破,以利于其恢复。()

(标准答案: 错)

163、身上着火后,应迅速用灭火器灭火。()

(标准答案: 错)

164、身上着火被熄灭后,应马上把粘在皮肤上的衣物脱下来。()

(标准答案: 错)

165、创伤伤口内有玻璃碎片等大块异物时,应在去医院救治前尽快取出。()

(标准答案: 错)

166、有毒化学药品溅在皮肤上时,可用乙醇等有机溶剂擦洗。()

(标准答案: 错)

167、对于重金属盐中毒者,可先喝一杯含有几克 $MgSO_4$ 的水溶液,然后立即就医。()

(标准答案: 对)

169、误吸入煤气等有毒气体时,应立即在室外呼吸新鲜空气。()

(标准答案: 对)

170、误吸入溴蒸气、氯气等有毒气体时,立即吸入少量酒精和乙醚的混合蒸气,以便解毒,同时应到室外呼吸新鲜空气,再送医院。()

(标准答案: 对)

171、误食了有毒化学品,要吃适量催吐剂尽快将其吐出来。()

(标准答案: 错)

172、使用剧毒药品时应该配备个人防护用具,做好应急救援预案。()

(标准答案: 对)

173、万一发生化学品泄漏事故,可用防毒面具、防毒口罩和捂湿毛巾等方法防止通过呼吸道造成伤害。()

(标准答案: 对)

174、为避免皮肤受到化学品伤害，可通过穿防毒衣，戴防护手套，穿雨衣、雨鞋等方法进行防护。（ ）

（标准答案：对）

175、进行化学类实验，应带防护镜。（ ）

（标准答案：对）

176、发生化学事故后，应向上风或侧上风方向迅速撤离现场。（ ）

（标准答案：对）

177、发生化学事故后，对有毒的衣物应及时进行无毒化处理。（ ）

（标准答案：对）

178、皮肤接触活泼金属(如钾、钠)，可用大量水冲洗。（ ）

（标准答案：错）

179、化学泡沫灭火器可扑救一般油质品、油脂等的火灾，但不能扑救醇、酯、醚、酮等引起的火灾和带电设备的火灾。（ ）

（标准答案：对）

180、危险化学品，包括爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、有毒品和腐蚀品等。（ ）

（标准答案：对）

181、毒物在科研生产中以气体、蒸气、烟、尘、雾等形态存在，其中气体、蒸气为分子状态，可直接进入人体肺泡。（ ）

（标准答案：对）

182、铅被加热到 400℃ 以上就有大量铅蒸汽逸出，在空气中迅速氧化为氧化铅，形成烟尘，易被人体吸入，造成铅中毒。（ ）

（标准答案：对）

183、轻度铅中毒症状为头晕、头痛、失眠、无力、腹痛、腹胀、便秘等。（ ）

（标准答案：对）

184、Hg 通常经过皮肤和消化道进入人体。（ ）

(标准答案: 错)

185、Hg 中毒会引起失眠、多梦、抑郁、胸闷、心悸、多汗、恶心、牙龈出血。

()

(标准答案: 对)

186、燃点越低的物品越安全。()

(标准答案: 错)

187、化学爆炸品的主要特点是:反应速度极快,放出大量的热,产生大量的气体,只有上述三者都同时具备的化学反应才能发生爆炸。()

(标准答案: 对)

188、液体表面的蒸汽与空气形成可燃气体,遇到火种时,发生一闪即灭的现象,可发生如此现象的最低温度称为闪点。()

(标准答案: 对)

189、一般将闪点在 25°C 以下的化学试剂列入易燃化学试剂,它们多是极易挥发的液体。()

(标准答案: 对)

190、对于一些吸入或食入少量即能中毒至死的化学试剂,生物试验中致死量(LD50)在 50mg/kg 以下的称为剧毒化学试剂。()

(标准答案: 对)

191、乙炔气钢瓶的规定涂色为白色、氯气钢瓶为黄色、氢气钢瓶为绿色、氟化氢钢瓶为灰色、液氨钢瓶为黄色。()

(标准答案: 对)

192、从消防观点来说,液体闪点就是可能引起火灾的最低温度。()

(标准答案: 对)

193、半数致死量(LD50)又称为半数致死浓度,是指药物能引起一群实验动物 50%死亡所需的剂量或浓度,用于药物的毒性分级,单位为 mg/kg。()

(标准答案: 对)

194、CO 经呼吸道进入血液后，立即与血红蛋白结合形成碳氧血红蛋白，CO 与血红蛋白的亲合力比氧大，致使血携氧能力下降，同时碳氧血红蛋白的解离速度却比氧合血红蛋白的解离慢 3600 倍，且碳氧血红蛋白的存在影响氧合血红蛋白的解离，阻碍了氧的释放，导致低氧血症，引起组织缺氧。（ ）

（标准答案：对）

195、当可燃气体、可燃液体的蒸气（或可燃粉尘）在空气中达到一定浓度时，遇到火源就会发生爆炸。这个能够发生爆炸的浓度范围，叫做爆炸极限。（ ）

（标准答案：对）

196、氢气的爆炸极限是：4%~75%。（ ）

（标准答案：对）

198、乙炔的爆炸极限是：2.2%~81%。（ ）

（标准答案：对）

199、苯的爆炸极限是：1.4%~7.1%。（ ）

（标准答案：对）

200、乙醚的爆炸极限是：1.9%~48%。（ ）

（标准答案：对）

201、丙酮的爆炸极限是：3%~11%。（ ）

（标准答案：对）

202、乙醇的爆炸极限是：4.3%~19%。（ ）

（标准答案：对）

203、因处理废液费用很高，应将无毒无害试剂与有毒有害试剂分开处理，例如稀 HAc、H₂SO₄、HCl、NaOH、KOH 等溶液可进行中和处理。（ ）

（标准答案：对）

204、安装在危险品仓库的灯具应该是防爆型的。（ ）

（标准答案：对）

205、实验室毒物进入人体有三条途径即皮肤、消化道和呼吸道。 实验室防毒应加强个人防护。（ ）

（标准答案：对）

206、实验室的药品和设备一定要标明其名称，以免误用。（ ）

（标准答案：对）

207、比较常见的引起呼吸道中毒的物质，一般是易挥发的有毒有机溶剂（如乙醚、三氯甲烷、苯等）或化学反应所产生的有毒气体（如氰化氢、氯气、一氧化碳等）。（ ）

（标准答案：对）

208、重金属如铅、镉、汞等对人体有害。（ ）

（标准答案：对）

209、汞剂、苯胺类、硝基苯等可通过皮肤或粘膜吸收而使人中毒。（ ）

（标准答案：对）

210、氮的氧化物、二氧化硫、三氧化硫、挥发性酸类、氨水对皮肤粘膜和眼、鼻、喉粘膜都有很强的刺激性。（ ）

（标准答案：对）

211、乙炔金属盐、环氧乙烷、偶氮氧化物等都属于易燃和易爆的化学试剂，处理时应该特别小心。（ ）

（标准答案：对）

212、可以在敞口容器中存放易爆物质。（ ）

（标准答案：错）

213、金属钠、钾可以存放在水中，以避免与空气接触。（ ）

（标准答案：错）

214、醋酸蒸汽与空气混合不会在热源的诱发下引起爆炸。（ ）

（标准答案：错）

215、久藏的乙醚因可能存在过氧化物，为了防止爆炸，在蒸发时必须有人值守，不能完全蒸干。（ ）

（标准答案：对）

216、在使用硝化纤维、苦味酸、三硝基甲苯、三硝基苯等物质时，绝不能直接加热或撞击，还要注意周围不要有明火。（ ）

（标准答案：对）

217、 H_2O_2 、 $AgNO_3$ 、 $AgCl$ 、 $KMnO_4$ 、草酸见光易分解，应置于棕色瓶内，放在阴凉避光处。（ ）

（标准答案：对）

218、 $SnCl_2$ 、 $FeSO_4$ 、 Na_2SO_3 与空气接触易逐渐被氧化，须密封保存。（ ）

（标准答案：对）

219、 Na 、 K 、电石、金属氢化物不能与水及空气接触，须密闭保存。（ ）

（标准答案：对）

220、 NH_4NO_3 受热后易分解，但放出的气体无害。（ ）

（标准答案：错）

221、磷化物（ Ca_3P_2 、 Zn_3P_2 等）有毒，遇水生成 H_3P ，其在空气中能自燃。

（ ）

（标准答案：对）

222、水浴加热的上限温度是 $100^\circ C$ ，油浴加热的上限温度是 $200^\circ C$ ，用硅油作介质时可加热到 $300^\circ C$ 。（ ）

（标准答案：错）

223、塑料制品在烘干过程中温度不能超过 $100^\circ C$ ，植物样品在烘干过程中不超过 $70^\circ C$ 。（ ）

（标准答案：错）

224、铬化合物中六价 Cr 毒性最大，有强刺激性，引起蛋白变性，干扰酶系统。

（ ）

(标准答案: 对)

225、Hg、As、Pb 等急性中毒会引起牙龈出血、牙齿松动、恶心、呕吐、腹痛、腹泻等症状。()

(标准答案: 对)

226、SO₂ 易溶于水, 大量吸入会引起喉水肿, 肺水肿、窒息。()

(标准答案: 对)

227、HCN 进入机体, 抑制呼吸酶作用, 造成细胞内窒息, 从而引起组织中毒性缺氧, 全身性中毒症状。()

(标准答案: 对)

228、将醇液直接加入到室温以下的硫酸-硝酸的混酸中不会引起爆炸, 而加入到未冷却的硫酸-硝酸的混酸中会引起爆炸。()

(标准答案: 错)

229、常用的化学试剂如: 苯、乙醚、甲苯、汽油、丙酮、甲醇和煤油均属于易燃物质。()

(标准答案: 对)

230、汞、苯、铬酸盐和氰化物属于对人体具有极度危害的物质。()

(标准答案: 对)

231、过氧化物、高氯酸盐、叠氮铅、乙炔铜、三硝基甲苯等属于易爆物质, 受震或受热可发生热爆炸。()

(标准答案: 对)

232、在使用化学品的工作场所吸烟, 可能会造成火灾和爆炸, 但不会中毒。()

(标准答案: 错)

233、用泡沫灭火剂扑灭油罐火灾时, 如果火势很大, 有时并不能将火完全扑灭, 会发生闷燃引起爆炸。()

(标准答案: 对)

234、室温下汞的蒸汽压为 0.0012 mmHg 柱, 比安全浓度标准大 100 倍。()

(标准答案: 对)

235、据统计, 火灾中死亡的人有 80% 以上属于烟气窒息致死。 ()

(标准答案: 对)

236、有毒化学品在水中的溶解度越大, 其危险性越大。 ()

(标准答案: 对)

237、液氯钢瓶与液氨钢瓶可以在同库存放。 ()

(标准答案: 错)

238、氰化钾、氰化钠、丙烯腈等是剧毒品, 进入人体 50 毫克即可致死, 与皮肤接触经伤口进入人体, 即可引起严重中毒。 ()

(标准答案: 对)

239、Cl₂ 和 CO 作用生成的光气毒性比 Cl₂ 大。 ()

(标准答案: 对)

240、乙醚、氯仿、笑气 (N₂O) 具有麻醉作用。 ()

(标准答案: 对)

241、汞及其化合物、砷及其无机化合物、黄磷、碘甲烷、甲基丙烯酸甲酯、氰化物等具有剧毒性。 ()

(标准答案: 对)

242、苯、三硝基甲苯、二硫化碳、丙烯腈、四氯化碳、甲醛、苯胺、氯丙烯、溴甲烷、环氧氯丙烷、光气、一氧化碳等具有高毒性。 ()

(标准答案: 对)

243、苯乙烯、甲醇、甲苯、二甲苯、三氯乙烯、苯酚等具有中等毒性。 ()

(标准答案: 对)

244、丙酮、氢氧化钠、氨等具有低毒性。 ()

(标准答案: 对)

245、汽油的爆炸极限是: 7.6%~1.4%。 ()

(标准答案: 对)

246、把玻璃管或温度计插入橡皮塞或软木塞时，常常会折断而使人受伤。下列不正确的操作方法是：（ ）

- A. 可在玻璃管上沾些水或涂上甘油等作润滑剂，一手拿着塞子，一手拿着玻璃管一端(两只手尽量靠近)，边旋转边慢慢地把玻璃管插入塞子中
- B. 橡皮塞等钻孔时，打出的孔比管径略小，可用圆锉把孔锉一下，适当扩大孔径
- C. 无需润滑,且操作时间与双手距离无关

（标准答案：C）

247、不慎发生意外，下列哪个操作是正确的？（ ）

- A. 如果不慎将化学品弄洒或污染，立即自行回收或者清理现场，以免对他人产生危险
- B. 任何时候见到他人洒落的液体应及时用抹布抹去，以免发生危险
- C. pH 值中性即意味着液体是水，自行清理即可
- D. 不慎将化学试剂弄到衣物和身体上，立即用大量清水冲洗 10—15 分钟

（标准答案：D）

248、以下物质中，哪些应该在通风橱内操作？（ ）

- A. 氢气
- B. 氮气
- C. 氦气
- D. 氯化氢

（标准答案：D）

249、超级恒温水浴使用时错误的操作是：（ ）

- A. 超级恒温水浴内应使用去离子水（或纯净水），
- B. 恒温水浴内去离子水未加到“正常水位”严禁通电，防止干烧
- C. 可以使用自来水

（标准答案：C）

250、大量试剂应放在什么地方？（ ）

- A. 试剂架上
- B. 实验室内试剂柜中
- C. 实验台下柜中
- D. 试剂库内

（标准答案：D）

251、高温实验装置使用注意事项错误的是：（ ）

- A. 注意防护高温对人体的辐射
- B. 熟悉高温装置的使用方法，并细心地进行操作
- C. 如不得已非将高温炉之类高温装置置于耐热性差的实验台上进行实验时，装置与台面之间要保留一厘米以上的间隙，并加垫隔热层，以防台面着火
- D. 使用高温装置的实验，要求在防火建筑内或配备有防火设施的室内进行，并要求密闭，减少热量损失

（标准答案：D）

252、过氧化酸、硝酸铵、硝酸钾、高氯酸及其盐、重铬酸及其盐、高锰酸及其盐、过氧化苯甲酸、五氧化二磷等是强氧化剂，使用时应注意：（ ）

- A. 环境温度不要高于 30℃
- B. 通风要良好
- C. 不要加热，不要与有机物或还原性物质共同使用
- D. 以上都是

（标准答案：D）

253、化学危险药品对人身会有刺激眼睛、灼伤皮肤、损伤呼吸道、麻痹神经、燃烧爆炸等危险，一定要注意化学药品的使用安全，以下不正确的做法是：（ ）

- A. 了解所使用的危险化学药品的特性，不盲目操作，不违章使用
- B. 妥善保管身边的危险化学药品，做到：标签完整，密封保存；避热、避光、远离火种。
- C. 室内可存放大量危险化学药品
- D. 严防室内积聚高浓度易燃易爆气体

（标准答案：C）

254、回流和加热时，液体量不能超过烧瓶容量的：（ ）

- A. 1/2
- B. 2/3
- C. 3/4
- D. 4/5

（标准答案：B）

255、离心操作时，为防液体溢出，离心管中样品装量不能超过离心管体积的多少？（ ）

- A. 2/3
- B. 1/3
- C. 1/2
- D. 3/4

（标准答案：A）

256、普通塑料、有机玻璃制品的加热温度不能超过：（ ）

- A. 40℃
- B. 60℃
- C. 80℃
- D. 100℃

(标准答案: B)

257、取用化学药品时, 以下哪些事项操作是正确的? ()

- A. 取用腐蚀和刺激性药品时, 尽可能带上橡皮手套和防护眼镜。
- B. 倾倒时, 切勿直对容器口俯视; 吸取时, 应该使用橡皮球。
- C. 开启有毒气体容器时应带防毒用具。
- D. 以上都是

(标准答案: D)

258、取用试剂时, 错误的说法是: ()

- A. 不能用手接触试剂, 以免危害健康和沾污试剂
- B. 瓶塞应倒置桌面上, 以免弄脏, 取用试剂后, 立即盖严, 将试剂瓶放回原处, 标签朝外
- C. 要用干净的药匙取固体试剂, 用过的药匙要洗净擦干才能再用
- D. 多取的试剂可倒回原瓶, 避免浪费

(标准答案: D)

259、涉及有毒试剂的操作时, 应采取的保护措施包括: ()

- A. 佩戴适当的个人防护器具
- B. 了解试剂毒性, 在通风橱中操作
- C. 做好应急救援预案
- D. 以上都是

(标准答案: D)

260、实验开始前应该做好哪些准备? ()

- A. 必须认真预习, 理清实验思路
- B. 应仔细检查仪器是否有破损, 掌握正确使用仪器的要点, 弄清水、电、气的管线开关和标记, 保持清醒头脑, 避免违规操作
- C. 了解实验中使用的药品的性能和有可能引起的危害及相应的注意事项
- D. 以上都是

(标准答案: D)

261、对于实验室的微波炉,下列哪种说法是错误的? ()

- A. 微波炉开启后,会产生很强的电磁辐射,操作人员应远离
- B. 严禁将易燃易爆等危险化学品放入微波炉中加热
- C. 实验室的微波炉也可加热食品
- D. 对密闭压力容器使用微波炉加热时应注意严格按照安全规范操作

(标准答案: C)

262、实验室内使用乙炔气时,说法正确的是: ()

- A. 室内不可有明火,不可有产生电火花的电器
- B. 房间应密闭
- C. 室内应有高湿度
- D. 乙炔气可用铜管道输送

(标准答案: A)

263、实验中用到很多玻璃器皿,容易破碎,为避免造成割伤应该注意什么? ()

- A. 装配时不可用力过猛,用力处不可远离连接部位
- B. 不能口径不合而勉强连接;
- C. 玻璃折断面需烧圆滑,不能有棱角
- D. 以上都是

(标准答案: D)

264、使用易燃易爆的化学药品,不正确的操作是: ()

- A. 可以用明火加热
- B. 在通风橱中进行操作
- C. 不可猛烈撞击
- D. 加热时使用水浴或油浴

(标准答案: A)

265、室温较高时，有些试剂如氨水等，打开瓶塞的瞬间很易冲出气液流，应先如何处理，再打开瓶塞？（ ）

- A. 先将试剂瓶在热水中浸泡一段时间
- B. 振荡一段时间
- C. 先将试剂瓶在冷水中浸泡一段时间
- D. 先将试剂瓶颠倒一下

（标准答案：C）

266、天气较热时，打开腐蚀性液体，应该：（ ）

- A. 直接用手
- B. 用毛巾先包住塞子
- C. 戴橡胶手套
- D. 用纸包住塞子

（标准答案：B）

267、往玻璃管上套橡皮管（塞）时，不正确的做法是：（ ）

- A. 管端应烧圆滑
- B. 用布裹手或带厚手套，以防割伤手
- C. 可以使用薄壁玻璃管
- D. 加点水或润滑剂

（标准答案：D）

268、稀硫酸溶液的正确制备方法是：（ ）

- A. 在搅拌下，加水于浓硫酸中
- B. 在搅拌下，加浓硫酸于水中
- C. 水加于浓硫酸，或浓硫酸加于水都无所谓
- D. 水与浓硫酸两者一起倒入容器混合

（标准答案：B）

269、下列实验操作中，说法正确的是：（ ）

- A. 可以对容量瓶、量筒等容器加热
- B. 在通风橱操作时, 可将头伸入通风柜内观察
- C. 非一次性防护手套脱下前必须冲洗干净, 而一次性手套时须从后向前把里面翻出来脱下后再扔掉
- D. 可以抓住塑料瓶子或玻璃瓶子的盖子搬运瓶子

(标准答案: C)

270、下列气体须在通风橱内进行的是: ()

- A. 硫化氢
- B. 氟化氢
- C. 氯化氢
- D. 以上都是

(标准答案: D)

271、下列实验室操作及安全的叙述, 正确的是? ()

- A. 实验后所取用剩余的药品应小心倒回原容器, 以免浪费。
- B. 当强碱溶液溅出时, 可先用大量的水稀释后再处理。
- C. 温度计破碎流出的汞, 宜洒上盐酸使反应为氯化汞后再弃之。

(标准答案: B)

272、箱式电阻炉使用过程中, 当温度升至多少度以上后, 不得打开炉门进行激烈冷却, 以免烧坏炉衬和电热元件? ()

- A、200℃
- B、400℃
- C、550℃
- D、800℃

(标准答案: A)

274、以下哪个药品(试剂)在使用时不用注意干燥防潮? ()

- A. 锂
- B. 碳化钙
- C. 磷化钙
- D. 二氧化硅

(标准答案: D)

275、应如何简单辨认有味的化学药品? ()

- A. 用鼻子对着瓶口去辨认气味
- B. 用舌头品尝试剂
- C. 将瓶口远离鼻子, 用手在瓶口上方扇动, 稍闻其味即可
- D. 取出一点, 用鼻子对着闻

(标准答案: C)

276、用剩的活泼金属残渣的正确处理方法是: ()

- A. 连同溶剂一起作为废液处理
- B. 在氮气保护下, 缓慢滴加乙醇, 进行搅拌使所有金属反应完毕后, 整体作为废液处理
- C. 将金属取出暴露在空气中使其氧化完全
- D. 以上都对

(标准答案: B)

277、有些固体化学试剂(如硫化磷、赤磷、镁粉等)与氧化剂接触或在空气中受热、受冲击或磨擦能引起急剧燃烧, 甚至爆炸。使用这些化学试剂时, 要注意什么: ()

- A. 要注意周围环境湿度不要太高
- B. 周围温度一般不要超过 30℃, 最好在 20℃ 以下
- C. 不要与强氧化剂接触
- D. 以上都是

(标准答案: D)

278、欲除去氯气时，以下哪一种物质作为吸收剂最为有效？（ ）

- A. 氯化钙
- B. 稀硫酸
- C. 硫代硫酸钠
- D. 氢氧化铅

（标准答案：C）

279、在使用化学药品前应做好的准备有：（ ）

- A. 明确药品在实验中的作用
- B. 掌握药品的物理性质（如：熔点、沸点、密度等）和化学性质
- C. 了解药品的毒性；了解药品对人体的侵入途径和危险特性；了解中毒后的急救措施
- D. 以上都是

（标准答案：D）

280、在蒸馏低沸点有机化合物时应采取哪种方法加热？（ ）

- A. 酒精灯
- B. 热水浴
- C. 电炉
- D. 砂浴

（标准答案：B）

281、关于重铬酸钾洗液，下列说法错误的是：（ ）

- A. 将化学反应用过的玻璃器皿不经处理，直接放入重铬酸钾洗液浸泡
- B. 浸泡玻璃器皿时，不可以将手直接插入洗液缸里取放器皿
- C. 从洗液中捞出器皿后，立即放进清洗杯，避免洗液滴落在洗液缸外等处。然后马上用水连同手套一起清洗。
- D. 取放器皿应戴上专用手套，但仍不能在洗液里的时间过长。

（标准答案：A）

282、处理使用后的废液时，下列哪个说法是错误的？（ ）

- A. 不明的废液不可混合收集存放
- B. 废液不可任意处理
- C. 禁止将水以外的任何物质倒入下水道，以免造成环境污染和处理人员危险
- D. 少量废液用水稀释后，可直接倒入下水道

（标准答案：D）

283、剧毒物品必须保管、储存在什么地方？（ ）

- A. 铁皮柜
- B. 木柜子
- C. 带双锁的铁皮保险柜
- D. 带双锁的木柜子

（标准答案：C）

284、管控类危化品保管人员应做到：（ ）

- A. 日清月结
- B. 帐物相符
- C. 台账齐全
- D. 以上都对

（标准答案：D）

285、处置实验过程产生的剧毒药品废液，说法错误的是：（ ）

- A. 妥善保管
- B. 不得随意丢弃、掩埋
- C. 集中保存，统一处理
- D. 稀释后用大量水冲净

（标准答案：D）

286、实验室冰箱和超低温冰箱使用注意事项错误的是：（ ）

- A. 定期除霜、清理，清理后要对内表面进行消毒
- B. 储存的所有容器，应当标明物品名称、储存日期和储存者姓名
- C. 除非有防爆措施，否则冰箱内不能放置易燃易爆化学品溶液，冰箱门上应注明这一点
- D. 可以在冰箱内冷冻食品和水

(标准答案：D)

287、实验完成后，废弃物及废液应如何处置？（ ）

- A. 倒入水槽中
- B. 分类收集后，送中转站暂存，然后交有资质的单位处理
- C. 倒入垃圾桶中
- D. 任意弃置

(标准答案：B)

288、下列加热热源，化学实验室原则不得使用的是：（ ）

- A. 明火电炉
- B. 水浴、蒸汽浴
- C. 油浴、沙浴、盐浴
- D. 电热板、电热套

(标准答案：A)

289、易燃化学试剂存放和使用的注意事项正确是：（ ）

- A. 要求单独存放于阴凉通风处
- B. 放在冰箱中时，要使用防爆冰箱
- C. 远离火源，绝对不能使用明火加热
- D. 以上都是

(标准答案：D)

290、实验室的废液应如何处理？（ ）

- A. 可直接倒入下水道
- B. 作为废液交相关部门统一处理
- C. 可以用来洗厕所
- D. 随意处置

(标准答案: B)

291、在普通冰箱中不可以存放什么物品? ()

- A. 普通化学试剂
- B. 酶溶液
- C. 菌体
- D. 有机溶剂

(标准答案: D)

292、领取剧毒物品时, 必须:) ()

- A. 双人领用(其中一人必须是实验室的教师)
- B. 单人领用
- C. 双人领用(两人都是实验室的学生)

(标准答案: A)

293、各实验室在运送化学废弃物到化学废弃物仓库之前, 可以: ()

- A. 堆放在走廊上
- B. 堆放在过道上
- C. 集中分类存放在实验室内, 贴好物品标签

(标准答案: C)

294、实验室的废弃化学试剂和实验产生的有毒有害废液、废物, 可以: ()

- A. 集中分类存放, 贴好标签, 待送中转站集中处理
- B. 向下水口倾倒
- C. 随垃圾丢弃

(标准答案: A)

295、易制毒易制爆等危化品使用完或残存物处理完的空瓶，应：（ ）

- A. 随生活垃圾丢弃
- B. 交到财务与资产处统一处置
- C. 交到综合办公室

（标准答案：B）

296、以下什么物质引起的皮肤灼伤禁用水洗？（ ）

- A. 五氧化二磷
- B. 五硫化磷
- C. 五氯化磷
- D. 以上都是

（标准答案：D）

297、当有汞（水银）溅失时，应如何处理现场？（ ）

- A. 用水擦
- B. 用拖把拖
- C. 扫干净后倒入垃圾桶
- D. 收集水银，用硫磺粉盖上并统一处理

（标准答案：D）

298、化学品的毒性可以通过皮肤吸收、消化道吸收及呼吸道吸收等三种方式对人体健康产生危害，下列不正确的预防措施是：（ ）

- A. 实验过程中使用三氯甲烷时戴防尘口罩
- B. 实验过程中移取强酸、强碱溶液应带防酸碱手套
- C. 实验场所严禁携带食物；禁止用饮料瓶装化学药品，防止误食
- D. 称取粉末状的有毒药品时，要带口罩防止吸入

（标准答案：A）

299、黄磷自燃应如何扑救：（ ）

- A. 用高压水枪
- B. 用高压灭火器
- C. 用雾状水灭火或用泥土覆盖
- D. 以上都对

(标准答案: C)

300、金属钠着火可采用的灭火方式有: ()

- A. 干砂
- B. 水
- C. 湿抹布
- D. 泡沫灭火器

(标准答案: A)

301、铝粉、保险粉自燃时如何扑救? ()

- A. 用水灭火
- B. 用泡沫灭火器
- C. 用干粉灭火器
- D. 用干砂子灭火

(标准答案: D)

302、强碱烧伤处理错误的是: ()

- A. 立即用稀盐酸冲洗
- B. 立即用 1%~2%的醋酸冲洗
- C. 立即用大量水冲洗
- D. 先进行应急处理, 再去医院处理

(标准答案: A)

303、容器中的溶剂或易燃化学品发生燃烧应如何处理? ()

- A. 用灭火器灭火或加砂子灭火
- B. 加水灭火

C. 用不易燃的瓷砖、玻璃片盖住瓶口

D. 用湿抹布盖住瓶口

(标准答案: A)

304、溶剂溅出并燃烧应如何处理? ()

A. 马上使用灭火器灭火

B. 马上向燃烧处盖砂子或浇水

C. 马上用石棉布盖住燃烧处, 尽快移去临近的其它溶剂, 关闭热源和电源, 再灭火

D. 以上都对

(标准答案: C)

305、实验过程中发生烧烫(灼)伤, 错误的处理方法是: ()

A. 浅表的小面积灼伤, 以冷水冲洗 15 至 30 分钟至散热止痛

B. 以生理食盐水擦拭 (勿以药膏、牙膏、酱油涂抹或以纱布盖住)

C. 若有水泡可自行刺破

D. 大面积的灼伤, 应紧急送至医院

(标准答案: C)

306、使用碱金属引起燃烧应如何处理? ()

A. 马上使用灭火器灭火

B. 马上向燃烧处浇水灭火

C. 马上用石棉布盖砂子盖住燃烧处, 尽快移去临近其它溶剂, 关闭热源和电源, 再用灭火器灭火

D. 以上都对

(标准答案: C)

307、试剂或异物溅入眼内, 处理措施正确的是: ()

A. 溴: 大量水洗, 再用 1%NaHCO₃ 溶液洗

B. 酸: 大量水洗, 用 1~2%NaHCO₃ 溶液洗

- C. 碱：大量水洗，再以 1%硼酸溶液洗
- D. 以上都对

(标准答案：D)

308、为了防止在开启或关闭玻璃容器时发生危险，下列哪一种瓶塞不适宜作为盛放具有爆炸危险性物质的玻璃容器的瓶塞？（ ）

- A. 软木塞
- B. 磨口玻璃塞
- C. 胶皮塞
- D. 橡胶塞

(标准答案：B)

309、眼睛被化学品灼伤后，首先采取的正确方法是：（ ）

- A. 点眼药膏
- B. 立即开大眼睑，用清水冲洗眼睛
- C. 马上到医院看急诊

(标准答案：B)

310、以下是酸灼伤的处理方法，其顺序为：①以 1~2%NaHCO₃ 溶液洗。②立即用大量水洗 ③送医院（ ）

- A. ①③②
- B. ②①③
- C. ③①②
- D. ③②①

(标准答案：B)

311、1027、以下是溴灼伤处理方法，其顺序为：①送医院 ②立即用大量水洗 ③用乙醇擦至灼伤处为白色。（ ）

- A. ②③①
- B. ②①③

C. ③②①

D. ①②③

(标准答案: A)

312、当不慎把大量浓硫酸滴在皮肤上时, 正确的处理方法是: ()

A. 用酒精棉球擦

B. 不作处理, 马上去医院

C. 用碱液中和后, 用水冲洗

D. 以吸水性强的纸或布吸去后, 再用水冲洗

(标准答案: D)

313、当不慎把少量浓硫酸滴在皮肤上(在皮肤上没形成挂液)时, 正确的处理方法是: ()

A. 用酒精棉球擦

B. 不作处理, 马上去医院

C. 用碱液中和后, 用水冲洗

D. 用水直接冲洗

(标准答案: D)

314、一般无机酸、碱液和稀硫酸不慎滴在皮肤上时, 正确的处理方法是: ()

A. 用酒精棉球擦

B. 不作处理, 马上去医院

C. 用水直接冲洗

D. 用碱液中和后, 用水冲洗

(标准答案: C)

315、皮肤若被低温(如固体二氧化碳、液氮)冻伤, 应: ()

A. 马上送医院

B. 用温水慢慢恢复体温

- C. 用火烘烤
- D. 应尽快浸入热水

(标准答案: B)

316、HCN 无色, 气味为: ()

- A. 无味
- B. 大蒜味
- C. 苦杏仁味
- D. 烂苹果味

(标准答案: C)

317、不具有强酸性和强腐蚀性的物质是: ()

- A. 氢氟酸
- B. 碳酸
- C. 稀硫酸
- D. 稀硝酸

(标准答案: B)

318、易燃类液体的特点是: ()

- A. 闪点在 25℃以下的液体, 闪点越低, 越易燃烧
- B. 极易挥发成气体
- C. 遇明火即燃烧
- D. 以上都是

(标准答案: D)

319、对于一些吸入或食入少量即能中毒至死的化学试剂, 生物试验中致死量

(LD50)在 50mg/kg 以下的称为剧毒化学试剂, 以下哪个不是剧毒化学试剂:

()

- A. 氰化钾
- B. 三氧化二砷

C. 氯化汞

D. 苯

(标准答案: D)

320、危险化学品包括哪些物质? ()

A. 爆炸品、易燃气体、易燃喷雾剂, 氧化性气体, 加压气体

B. 易燃液体, 易燃固体, 自反应物质, 可自燃液体, 自燃自热物质, 遇水放出易燃气体的物质

C. 氧化性液体, 氧化性固体, 有机过氧化物, 腐蚀性物质

D. 以上都是

(标准答案: D)

321、危险化学品的毒害包括: ()

A. 皮肤腐蚀性/刺激性, 眼损伤/眼刺激

B. 急性中毒致死, 器官或呼吸系统损伤, 生殖细胞突变性, 致癌性

C. 水环境危害性, 放射性危害

D. 以上都是

(标准答案: D)

322、危险化学品的急性毒性表述中, 半致死量 LD50 代表什么意义? ()

A. 致死量

B. 导致一半受试动物死亡的量

C. 导致一半受试动物死亡的浓度

D. 导致全部受试动物死亡的浓度

(标准答案: B)

323、表示危险化学品的急性毒性的 LD50 的单位是什么? ()

A. mg/kg

B. g/kg

C. mL/kg

D. ug/kg

(标准答案: A)

324、下列那一项不是发生爆炸的基本因素? ()

A. 温度

B. 压力

C. 湿度

D. 着火源

(标准答案: C)

325、下面哪些物质彼此混合时, 不容易引起火灾? ()

A. 活性炭与硝酸铵

B. 金属钾、钠和煤油

C. 磷化氢、硅化氢、烷基金属、白磷等物质与空气接触

D. 可燃性物质(木材、织物等)与浓硫酸

(标准答案: B)

327、遇水发生剧烈反应, 容易产生爆炸或燃烧的化学品是: ()

A. K、Na、Mg、Ca、Li、AlH₃、电石

B. K、Na、Ca、Li、AlH₃、MgO、电石

C. K、Na、Ca、Li、AlH₃、电石

D. K、Na、Mg、Li、AlH₃、电石

(标准答案: C)

328、苯乙烯、乙酸乙烯酯应如何存放? ()

A. 放在防爆冰箱里

B. 和其它试剂混放

- C. 放在通风橱内
- D. 放在密闭的柜子中

(标准答案: A)

329、不需要放在密封的干燥器内的药品是: ()

- A. 过硫酸盐
- B. 五氧化二磷
- C. 三氯化磷
- D. 盐酸

(标准答案: D)

331、以下哪种物质不会灼伤皮肤? ()

- A. 强碱、强酸
- B. 强氧化剂
- C. 溴
- D. KBr、NaBr 水溶液

(标准答案: D)

332、氮氧化物主要伤害人体的: ()

- A. 眼、上呼吸道
- B. 呼吸道深部的细支气管、肺泡
- C. 皮肤
- D. 消化道

(标准答案: B)

333、关于存储化学品说法错误的是: ()

- A. 化学危险物品应当分类、分项存放, 相互之间保持安全距离
- B. 遇火、遇潮容易燃烧、爆炸或产生有毒气体的化学危险品, 不得在露天、潮湿、漏雨或低洼容易积水的地点存放

C. 受阳光照射易燃烧、易爆炸或产生有毒气体的化学危险品和桶装、罐装等易燃液体、气体应当在密闭地点存放

D. 防护和灭火方法相互抵触的化学危险品，不得在同一仓库或同一储存室存放

(标准答案：C)

334、关于存放自燃性试剂说法错误的是：()

A. 单独储存

B. 储存于通风、阴凉、干燥处

C. 存放于试剂架上

D. 远离明火及热源，防止太阳直射

(标准答案：C)

335、关于化学品的使用、管理，下列说法哪个是错误的？()

A. 打开塑料瓶的化学品时不要过于用力挤压，否则可能导致液体溢出或迸溅到身体上

B. 有机溶剂可以置于普通冰箱保存

C. 分清标签，认真阅读标签，按标签使用

D. 共用化学品从专用柜里取出，使用时注意保持标签的完整，用后放回专用柜

(标准答案：B)

336、氢氟酸有强烈的腐蚀性和危害性，皮肤接触氢氟酸后可出现疼痛及灼伤，随时间疼痛渐剧，皮肤下组织被破坏，这种破坏会传播到骨骼。下面哪个说法是错误的？()

A. 稀的氢氟酸危害性很低，不会产生严重烧伤

B. 氢氟酸蒸气溶于眼球内的液体中会对人的视力造成永久损害

C. 使用氢氟酸一定要戴防护手套，注意不要接触氢氟酸蒸汽

D. 工作结束后要注意用水冲洗手套、器皿等，不能有任何残余留下

(标准答案：A)

337、化学药品库中的一般药品应如何分类？()

- A. 按生产日期分类
- B. 按有机、无机两大类，有机试剂再细分类存放
- C. 随意摆放
- D. 按购置日期分类

(标准答案: B)

338、混和时不会生成高敏感、不稳定或者具有爆炸性物质的是: ()

- A. 醚和醇类
- B. 烯烃和空气
- C. 氯酸盐和铵盐
- D. 亚硝酸盐和铵盐

(标准答案: A)

339、混和或相互接触时, 不会产生大量热量而着火、爆炸的是: ()

- A. (亚、次) 氯酸盐和酸
- B. CrO_3 和可燃物
- C. KMnO_4 和可燃物
- D. CCl_4 和碱金属

(标准答案: D)

340、活泼金属应存放在何处? ()

- A. 密封容器中并放入冰箱
- B. 密封容器中并放入干燥器
- C. 泡在煤油里密封避光保存
- D. 密封容器中并放入密闭柜子内

(标准答案: C)

341、金属 Hg 具有高毒性, 常温下挥发情况如何? ()

- A. 不挥发
- B. 慢慢挥发

- C. 很快挥发
- D. 需要在一定条件下才会挥发

(标准答案: B)

342、领取及存放化学药品时, 以下说法错误的是: ()

- A. 确认容器上标示的中文名称是否为需要的实验用药品。
- B. 学习并清楚化学药品危害标示和图样。
- C. 化学药品应分类存放。
- D. 有机溶剂, 固体化学药品, 酸、碱化合物可以存放于同一药品柜中。

(标准答案: D)

343、氯气急性中毒可引起严重并发症, 如气胸、纵隔气肿等, 不会引起什么症状? ()

- A. 中、重度昏迷
- B. 支气管哮喘
- C. 慢性支气管炎
- D. 严重窒息

(标准答案: C)

344、钠, 钾等碱金属须贮存于: ()

- A. 水中
- B. 酒精中
- C. 煤油中
- D. 暴露在空气中

(标准答案: C)

345、以下药品按毒性从大到小排序正确的是: ()

- A. 甲醛、苯、苯乙烯、丙酮
- B. 苯、甲醛、甲苯、丙酮

C. 甲苯、甲醛、苯、丙酮

D. 苯、丙酮、甲苯、甲醛

(标准答案: B)

346、闪点越低,越容易燃烧。闪点在 -4°C 以上的溶剂是: ()

A. 甲醇、乙醇、乙腈

B. 乙酸乙酯、乙酸甲酯

C. 乙醚、石油醚

D. 汽油、丙酮、苯

(标准答案: A)

347、实验人员都要注意防止被实验设备产生的 X 射线照射,下列能够产生 X 射线的仪器是: ()

A. X 射线衍射仪

B. 分光光度计

C. 液相色谱

D. 气相色谱

(标准答案: A)

348、为了安全,须贮存于煤油中的金属是: ()

A. 钠

B. 铝

C. 铁

D. 钙

(标准答案: A)

349、下列不属于易燃液体的是: ()

A. 5%稀硫酸

B. 乙醇

C. 苯

D. 二硫化碳

(标准答案: A)

350、下列说法错误的是: ()

A. 丙酮、乙醇都有较强的挥发性和易燃性,二者都不能在任何有明火的地方使用

B. 丙酮会对肝脏和大脑造成损害,因此避免吸入丙酮气体

C. 强酸强碱等不能与身体接触

D. 弱酸弱碱在使用中可以与身体接触

(标准答案: D)

351、下列关于混合物的描述错误的是: ()

A. 三氧化铬的硫酸溶液与有机物混合,可能爆炸

B. 硝酸氨与活性炭混合可能燃烧

C. 高氯酸与金属盐混合可能爆炸

D. 高氯酸与盐酸混合可能爆炸

(标准答案: D)

352、下列何者是会发生爆炸的物质? ()

A. 氧化锌

B. 三硝基甲苯

C. 四氯化碳

D. 氧化铁

(标准答案: B)

353、下列何种物质贮存于空气中易发生爆炸? ()

A. 苯乙烯

B. 对二甲苯

- C. 苯
- D. 甲苯

(标准答案: A)

354、下列哪种物质与乙醇混溶时易发生爆炸? ()

- A. 盐酸
- B. 乙醚
- C. 高氯酸
- D. 丙酮

(标准答案: C)

355、不是实验室常用于皮肤或普通实验器械的消毒液为? ()

- A. 0.2%-1% 漂白粉溶液
- B. 70%乙醇
- C. 2%碘酊
- D. 0.2%-0.5%的洗必泰

(标准答案: A)

356、下列试剂哪个不用放在棕色瓶内保藏? ()

- A. 硫酸亚铁
- B. 高锰酸钾
- C. 亚硫酸钠
- D. 硫酸钠

(标准答案: D)

357、下列物质毒性较低的是: ()

- A. 乙二醇
- B. 硫化氢
- C. 乙醇
- D. 甲醛

(标准答案: C)

358、下列物质应避免与水接触以免发生危险的是: ()

- A. 氯化钠
- B. 氯化钙
- C. 四氢化铝
- D. 硫酸钙

(标准答案: C)

361、下面哪组溶剂不属易燃类液体? ()

- A. 甲醇、乙醇
- B. 四氯化碳、乙酸
- C. 乙酸丁酯、石油醚
- D. 丙酮、甲苯

(标准答案: B)

362、下面所列试剂不用分开保存的是: ()

- A. 乙醚与高氯酸
- B. 苯与过氧化氢
- C. 丙酮与硝基化合物
- D. 浓硫酸与盐酸

(标准答案: D)

363、一般将闪点在 25℃以下的化学试剂列入易燃化学试剂, 它们多是极易挥发的液体。以下哪种物质不是易燃化学试剂? ()

- A. 乙醚
- B. 苯

C. 甘油

D. 汽油

(标准答案: C)

364、金属钾、钠、锂、钙、电石等固体化学试剂,遇水即可发生激烈反应,并放出大量热,也可产生爆炸,它们应如何存放: ()

A. 直接放在试剂瓶中保存

B. 浸没在煤油中保存(容器不得渗漏),附近不得有盐酸、硝酸等散发酸雾的物质存在

C. 用纸密封包裹存放

D. 放在铁盒子里

(标准答案: B)

365、以下几种气体中,无毒的气体为: ()

A. 氧气

B. 一氧化碳

C. 硫化氢

D. 氰化氢

(标准答案: A)

366、以下几种气体中,有毒的气体为: ()

A. 氧气

B. 氮气

C. 氯气

D. 二氧化碳

(标准答案: C)

367、以下几种气体中,最毒的气体为: ()

A. 氯气

B. 光气(COCL₂)

- C. 二氧化硫
- D. 三氧化硫

(标准答案: B)

368、以下哪种酸具有强腐蚀性,使用时须做必要防护: ()

- A. 硝酸
- B. 硼酸
- C. 稀醋酸

(标准答案: A)

369、以下药品受震或受热可能发生爆炸的是: ()

- A. 过氧化物
- B. 高氯酸盐
- C. 乙炔铜
- D. 以上都是

(标准答案: D)

370、以下药品中,可以与水直接接触的是: ()

- A. 金属钠、钾
- B. 电石
- C. 白磷
- D. 金属氢化物

(标准答案: C)

371、以下液体中,投入金属钠最可能发火燃烧的是: ()

- A. 无水乙醇
- B. 苯
- C. 水
- D. 汽油

(标准答案: C)

372、有些固体化学试剂接触空气即能发生强烈氧化作用,如黄磷,应如何保存:

()

- A. 要保存在水中
- B. 放在试剂瓶中保存
- C. 用纸包裹存放
- D. 放在盒子中

(标准答案: A)

373、减压蒸馏时应用下列哪一种器皿作为接收瓶和反应瓶? ()

- A. 薄壁试管
- B. 锥形瓶、圆底烧瓶
- C. 平底烧瓶

(标准答案: B)

374、强氧化剂与有机物、镁粉、铝粉、锌粉可形成爆炸性混合物,以下哪种物质是安全的? ()

- A. H₂O₂
- B. NH₄NO₃
- C. K₂SO₄
- D. 高氯酸及其盐

(标准答案: C)

375、苯属于高毒类化学品,下列叙述正确的是: ()

- A. 短期接触,苯对中枢神经系统产生麻痹作用,引起急性中毒。
- B. 长期接触,苯会对血液造成极大伤害,引起慢性中毒。
- C. 对皮肤、粘膜有刺激作用,是致癌物质
- D. 以上都是

(标准答案: D)

376、丙酮属于低毒类化学品,下列叙述正确的是: ()

- A. 它的闪点只有-18℃，具有高度易燃性。。
- B. 对神经系统有麻醉作用，并对黏膜有刺激作用。
- C. 它的沸点只有 56℃，极易挥发；
- D. 以上都对

（标准答案：D）

377、在实验室内一切有可能产生毒性蒸气的工作必须在通风橱中进行，并有良好的排风设备。（ ）

（标准答案：对）

378、实验室内的浓酸、浓碱处理，一般要先中和后倾倒，并用大量的水冲洗管道。（ ）

（标准答案：对）

379、对于无机酸类废液，实验室可以收集后进行如下处理：将废酸慢慢倒入过量的含碳酸钠或氢氧化钙的水溶液中（或用废碱）互相中和，再用大量水冲洗。

（ ）

（标准答案：对）

380、对于含汞、砷、锑、铋等离子的废液,实验室可以先进行如下处理：控制酸度 $0.3\text{mol/L}[\text{H}^+]$ ，使其生成硫化物沉淀。（ ）

（标准答案：对）

381、当浓碱撒在桌面上时，先用稀醋酸中和，然后用水冲洗，用抹布擦干净。

（ ）

（标准答案：对）

382、四氯化碳、氯仿、二氯乙烷、溴甲烷、溴乙烷、碘乙烷等：（ ）

- A. 对肾功能无损害作用
- B. 在体内的浓度低时，无损害作用
- C. 对肾功能有严重损害作用
- D. 能与食物中的成分发生化学反应而被排出体外，因而无损害作用

(标准答案: C)

383、关于高压气体钢瓶使用的下列说法中, 错误的是: ()

- A. 高压气体钢瓶应于容器上明显标出图示、成份、危害注意事项等标示
- B. 高压气体钢瓶应置于通风良好的场所、隔离热源并避免日光照射、温度保持于 40℃ 以下
- C. 各类高压气体钢瓶的减压阀可以通用
- D. 高压气体钢瓶放置时需有安全固定措施或置于气瓶柜中, 以防地震时发生危害且放置场所应明确标示

(标准答案: C)

384、关于压缩气体和液化气体的下列描述, 正确的是: ()

- A. 不带静电
- B. 晃动一下气瓶时即产生静电
- C. 气瓶须有接地装置
- D. 从管口破损处高速喷出时, 由于强烈的摩擦作用, 会产生静电

(标准答案: D)

385、危险化学品安全标签使用注意事项的下列说法中, 错误的是: ()

- A. 标签的粘贴、挂拴、喷印应牢固, 保证在运输及储存期间不脱落、不损坏
- B. 标签应由生产企业在货物出厂前粘贴、挂拴、喷印。若要改换包装, 则由改换包装单位重新粘贴、挂拴、喷印标签
- C. 盛装危险化学品的容器或包装, 在经过处理并确认其危险性完全消除之后, 方可撕下标签, 否则不能撕下相应的标签
- D. 标签附于产品包装容器内, 由用户开启使用时粘贴于包装容器外

(标准答案: D)

386、易燃液体的安全使用不包括下列哪项内容? ()

- A. 易燃液体的供给量应控制在有效并安全进行实验的最小量
- B. 可用冰箱进行低温储存

- C. 应在专门的储藏室或通风橱内从储藏罐里倒出易燃液体
- D. 加热易燃液体必须在通风橱中进行，且不能使用明火加热

(标准答案: B)

387、当油脂等有机物沾污氧气钢瓶时，应立即用以下哪种洗净。()

- A. 乙醇
- B. 四氯化碳
- C. 水
- D. 汽油

(标准答案: B)

388、下列物品不属于剧毒化学品的是：()

- A. 氰化钾
- B. 氯化汞
- C. 铊
- D. 甲醛

(标准答案: D)

389、下列物质中，与乙醇混溶时易发生爆炸的是()

- A. 高氯酸
- B. 乙醚
- C. 水
- D. 丙酮

(标准答案: A)

390、盐酸、甲醛溶液、乙醚等易挥发试剂应如何合理存放？()

- A. 和其它试剂混放
- B. 放在冰箱中
- C. 分类存放在干燥带锁的试剂柜里
- D. 放在密闭的柜子中

(标准答案: C)

391、人员进入化学类实验室工作,一定要搞清楚()等位置,出现情况能做好相应的自救工作。()

- A. 门窗的位置
- B. 易燃、易爆物品大位置
- C. 冲眼器、紧急喷淋、急救药箱的位置

(标准答案: C)

392、氧化钙的水溶液中(或用废碱)互相中和,再用大量水冲洗。()

(标准答案: 对)

393、搬运剧毒化学品后,应该:()

- A. 用流动的水洗手
- B. 吃东西补充体力
- C. 休息

(标准答案: A)

394、在实验过程中,有液体燃料发生火灾,_____ ()

- A. 只能用水来灭火
- B. 只能用黄沙来灭火
- C. 可以用水剂灭火器来灭火
- D. 只能用二氧化碳灭火器来灭火

(标准答案: B)

395、实验室里“我知道这个是水!”可以喝。()

(标准答案: 错)

396、闻气体可以不挥气入鼻。()

(标准答案: 错)

397、回流或蒸馏液体时应放沸石,以防溶液因过热暴沸而冲出。若在加热后发现未放沸石,则应立刻补加沸石。()

(标准答案: 错)

398、刷瓶子,一定要里外都刷,省得你后来再花时间去找那点脏东西究竟是里面的还是外面的。()

(标准答案: 对)

399、减压蒸馏时,要用圆底烧瓶或吸滤瓶作接受器,不可用锥形瓶。()

(标准答案: 对)

400、所用样品多或者是有的样品以后还要用的时候,一定要贴上标签。()

(标准答案: 对)

401、有灼烧的金属或熔融物的地方着火时,应用干泡沫灭火器。()

(标准答案: 错)

402、做实验最好戴一个玻璃镜片眼睛,防止溶剂和腐蚀物质溅到眼睛,树脂镜片更是容易被腐蚀。()

(标准答案: 对)

403、加热试管一定不能集中加热,严防液体过热而冲料。()

(标准答案: 对)

404、器设备或带电系统着火,可用二氧化碳灭火器或四氯化碳灭火器。()

(标准答案: 对)

405、关旋蒸的时候,注意一定要先拔真空,后关泵。()

(标准答案: 对)

406、瓶子放在冰箱里,一定要注意不要把塞子塞太紧。()

(标准答案: 对)

407、酒精及其它可溶于水的液体着火时,可用水灭火。()

(标准答案: 对)

408、所有的有机溶剂不能在烧瓶内直火加热。()

(标准答案: 对)

410、不要因为浓度很低而忽视，因为随着水份的蒸发，硫酸的浓度增高，而会使得原来的洗硫酸同样变成浓硫酸。（ ）

（标准答案：对）

411、用漏斗加液体溶剂，一定要注意不要一次加太多，留下一点为了后面洗漏斗用。（ ）

（标准答案：对）

412、易挥发的溶剂，决不能放在冰箱里面。（ ）

（标准答案：对）

413、浓酸、浓碱具有强腐蚀性，切勿溅在皮肤和衣服上。用浓 HNO₃、HCl、HClO₄、H₂SO₄ 等溶解样品时均应在通风橱中进行操作，不准在实验台上直接进行操作。（ ）

（标准答案：对）

415、废液，特别是强酸和强碱不能直接倒在水槽中，应先稀释，然后倒入水槽，再用大量自来水冲洗水槽及下水道。（ ）

（标准答案：对）

416、如酚触及皮肤引起灼伤，可用酒精洗涤。（ ）

（标准答案：对）

417、因泡沫能导电，不能用于扑灭电器着火。（ ）

（标准答案：对）

418、取用化学药品时，以下哪些事项操作为正确的？（ ）

- A. 取用腐蚀和刺激性药品时，尽可能不带橡皮手套和防护眼镜，以免加快操作速度，减少与这些药品的接触
- B. 倾倒时，切勿直对容器口俯视；吸取时，应该使用橡皮球
- C. 开启有毒气体容器时应带普通口罩
- D. 取固体块状药品时，因尽可能用药勺

(标准答案: B)

419、下列常用仪器中不能直接用火加热的是: ()

- A. 蒸发皿
- B. 烧杯
- C. 坩埚
- D. 表面皿

(标准答案: D)

421、使用剧毒化学品必须有两人操作,并在剧毒化学品使用登记表上记录? ()

- A. 用途、使用量、剩余量
- B. 成分、种类
- C. 特性、组成
- D. 种类、特性、组成

(标准答案: A)

422、以下药品中,能与水直接接触的是: ()

- A. 金属钠、钾
- B. 电石
- C. 白磷
- D. 金属氢化物

(标准答案: C)

423、下面所列试剂中可以放在一起保存的是: ()

- A. 乙醚与高氯酸
- B. 苯与过氧化氢
- C. 浓硫酸与盐酸
- D. 丙酮与硝基化合物

(标准答案: C)

424、下列试剂哪些不需要放在棕色瓶内保藏？（ ）

- A. 硫酸亚铁
- B. 高锰酸钾
- C. 亚硫酸钠
- D. 硫酸钠

（标准答案：D）

426、关于存储化学品说法不正确的是：（ ）

- A. 化学危险物品应当分类、分项存放，相互之间保持安全距离
- B. 遇火、遇潮容易燃烧、爆炸或产生有毒气体的化学危险品，不得在露天、潮湿、漏雨或低洼容易积水的地点存放
- C. 受阳光照射易燃烧、易爆炸或产生有毒气体的化学危险品和桶装、罐装等易燃液体、气体应当在密闭地点存放
- D. 防护和灭火方法相互抵触的化学危险品，不得在同一仓库或同一储存室存放

（标准答案：C）

434、下列有关实验操作的说法中，不正确的是：（ ）

- A. 振荡试管中的液体时，应用手指拿住试管，左右摆动手腕振荡试管
- B. 在做蒸馏实验时要加入少量的碎瓷片，以防止溶液暴沸
- C. 如果皮肤上不慎沾上浓硫酸，应立即用大量的 NaOH 稀溶液冲洗
- D. 用石蕊或酚酞试纸进行气体验满时，最好先用蒸馏水湿润

（标准答案：C）

436、实验中发生下列事故，处理方法正确的是：（ ）

- A. 钠着火用泡沫灭火器扑灭
- B. 苯酚沾在手上，应马上用 NaOH 溶液洗
- C. 皮肤上沾有浓硫酸，立即用大量水冲洗
- D. 酒精灯在桌上歪倒失火后，立即用湿布盖上

(标准答案: D)

437、下列试剂保存方法正确的是: ()

- A. 少量白磷保存在水里
- B. 钠保存在水里
- C. 液溴保存在无色试剂瓶里
- D. 装 NaOH 溶液的试剂瓶用玻璃塞

(标准答案: A)